



散布・空散・無人航空機
散布方法を選べる!!



様々な作物を守って キレイに仕上がる!!

殺菌剤

トップジンM[®] ゴル

チオファネートメチル水和剤

■有効成分:チオファネートメチル…40.0%
■人畜毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
■包装:500ml×20本、5Lポリ缶×4本

殺菌剤分類

1

特長

- 広範囲の作物・病害の予防と治療に優れた効果を発揮します。
- 液体タイプの剤型なので、粉立ちがなく作物が汚れにくい。
- ヘリコプターや無人航空機散布の登録を有し、散布作業の省力化がはかれます。

適用病害と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数（制限）を示す。

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用用量 (ℓ/10a)	使用※ 時期	総使用回数※		使用方法
					本剤	チオファネートメチル	
稲	いもち病	1,000	60~150	14日	3回	3回 [種子への 処理は1回]	散布
		原液	0.2				空中散布
	4	0.8	無人航空機 による散布				
	4~8						
変色米 (エビコッカム菌)	8	1,000	60~ 150	散布			
墨黒穂病 紋枯病	8						
小麦	雪腐大粒菌核病	1,000	60~150	根雪前	3回 [出穂期 以降は 2回]	4回 [種子への処理は1回 散布及び無人航空機 散布は合計3回 出穂期以降は2回]	無人航空機 による散布
		10					14日
赤かび病	8	60~150	21日	3回 [出穂期 以降は 1回]	3回 [種子への処理は1回 出穂期以降は1回]	無人航空機 による散布	
	1,000~1,500						
麦類 (小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	1,500	60~150	根雪前	3回 [出穂期 以降は 1回]	3回 [種子への処理は1回 出穂期以降は1回]	無人航空機 による散布
		8					
やまのいも	葉渋病、炭疽病	10	3	7日	5回	5回	無人航空機 による散布
		5					
だいず	紫斑病	5	0.8	14日	4回	4回 [種子への 処理は1回]	空中散布
		20~30					
なす	菌核病	1,000	100~ 300	前日	5回	6回 [種子への処理は1回 は種後は5回]	散布
きゅうり	菌核病、炭疽病						
トマト	葉かび病、菌核病	600~1,000	0.8	前日	3回	7回 [種子への処理は1回 苗根部浸漬は1回 無人航空機散布は3回 散布は5回]	無人航空機 による散布
たまねぎ	灰色腐敗病						
れんこん	褐斑病	5	3	75日	3回	3回	空中散布
		16					
みかん	そうか病	20	8	4~6月	5回	8回 [塗布は3回、散布、 空中散布及び無人航空機 散布は合計5回]	散布
		700~1,000					
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害 [青かび病 緑かび病 軸腐病]	1,000~2,000	200~ 700	前日	5回	8回 [塗布は3回、 散布及び無人航空機 散布は合計5回]	無人航空機 による散布
		20~30	10				
キウイフルーツ	果実軟腐病	10~15	5	前日	5回	8回 [塗布は3回、 散布及び無人航空機 散布は合計5回]	無人航空機 による散布
		30	10				
もも	灰星病	15	5	前日	5回	8回 [塗布は3回、 散布及び無人航空機 散布は合計5回]	無人航空機 による散布
		2,000					
りんどう	花腐菌核病	1,000	100~700	発病初期	5回	8回 [塗布は3回 散布は5回]	散布
ストック	菌核病						
ばら	黒星病	1,000	100~ 300	発病初期	5回	5回	散布
プリムラ	灰色かび病						
シンビジウム	炭疽病	1,000	100~ 300	発病初期	5回	5回	散布
ゆり	葉枯病						
きく	黒斑病、褐斑病	-	-	-	-	-	-

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。
- 使用に際しては容器をよく振ってから所定量を取り出し、水に入れよく攪拌して散布液を調製してください。
- 長時間放置すると沈殿を生じることがありますが、振れば容易に元の状態に戻るのを、必ず元の状態に戻してから使用してください。
- ボルドー液との混用はさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣るおそれがあるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる他の薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 大型散布機（ヘリコプターなど）で使用する場合は各散布機種別の散布基準に従って実施してください。
- 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - (1) 微量散布 (0.2ℓ/10a) 及び少量散布 (0.8ℓ/10a) の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - (2) 無人航空機による散布にあつては、散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - (3) 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管、その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - (4) 微量散布の場合、他の農薬との混合は行わないでください。また少量散布の場合は特定の農薬混合が可能と確認されているものを除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
 - (5) 散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - (6) 作業後は次の項目を守ってください。
 - ・ 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
 - ・ 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に責任者をきめて保管してください。
 - ・ 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- ぶどうに使用する場合、幼果期以降の散布は果粉の溶脱や果実の汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
- だいずの紫斑病に対しては、落花後～若英期に2~3回散布してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 散布の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - 作業時に着用していた衣服などは、他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
- 保 管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

● 使用前にラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は、2020年12月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
 ☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084
<https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>