

# トップメリット® フロアブル

TOPMERIT

登録番号 第24618号  
 種類名 ピロキサスルホン・リニュロン水和剤  
 pyroxasulfone・linuron  
 除草剤分類 15, 5  
 性状 淡褐色～褐色水和性粘稠懸濁液体  
 有効年限 4年

有効成分 ピロキサスルホン 3.4%、 リニュロン 24.0%  
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
 包装 3ℓ×6本(北海道限定)

■特 長

1. 新規成分ピロキサスルホンがスズメノカタビラに高い効果を発揮します。
2. 幅広い一年生雑草の発生を約40日間抑制可能です。
3. 低薬量なのでコンパクトなうえ、フロアブル剤で使いやすい薬剤です。



最新の登録内容、  
SDSはこちら

■適用作物・雑草名及び使用方法

(2023年10月11日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり 使用量		本剤の 使用 回数	ピロキサス ルホンを含む 農薬の 総使用回数	リニュロンを 含む農薬の 総使用回数	使用 方法
			薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)				
だ い ず え だ ま め	一年生雑草	は種後 出芽前 (雑草 発生前)	250～ 350	100	1回	1回	2回以内 [全面土壌散布] は1回以内、 雑草茎葉兼 土壌散布は 1回以内	全面 土壌 散布
飼料用とうもろこし とうもろこし							1回	

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 散布薬液の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害を生じるおそれがあるので、散布の際には隣接作物にかからないように注意してください。特に風の強い時の使用はさけてください。
2. マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は薬害を生じるおそれがあるので、さけてください。
3. とうもろこしに使用する場合、薬害を生じるおそれがあるのでスーパースイート系には使用しないでください。
4. 稲、大麦、ソルガムに薬害を生じるおそれがあるので、散布した当年または翌年の栽培をさけてください。
5. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

**水産動植物への影響：**水産動植物（藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

**保管：**直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

●トップメリットフロアブルの上手な使い方

- ①砂土、整地はていねいに行い、種子が露出しないように覆土はできるだけていねいに行い、覆土深を2～3cm以上としてください。
- ②土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、土壌が適度の水分を含んでいる時に使用してください。  
※土壌を手のひらで軽く握った土壌塊を簡単に崩せる状態が適湿です。

---

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。