

べと病、疫病、白さび病を
ピシッとロック!!



殺菌剤

ピシッとロック® フロアブル

ピカルブトラゾクス水和剤

LINEクリエイターズでスタンプ販売中



日本曹達株式会社



べと病、疫病、白さび病を **ピシッとロック!**

殺菌剤

ピシロック[®]
フロアブル

有効成分：ピカルブトラゾクス… 5.0%

殺菌剤分類 **U17**

人畜毒性：普通物

(毒劇物に該当しないものを指している通称)



特長

- べと病、疫病等、卵菌類由来の病害に対して高い効力を示します。
- 新規系統のテトラゾリルオキシム系殺菌剤です。(新規作用機構 [推定] U17)
既存の殺菌剤耐性菌に対しても有効ですので、ローテーション散布の1剤として期待できます。
- 収穫前日まで散布できます。
- 予防効果が主体の殺菌剤です。浸達活性があります。

上手な使い方

発病前～発病初期に使用するとより高い効果が期待できます。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数	使用方法
みかん	褐色腐敗病	1,000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布
キャベツ	べと病、ピシウム腐敗病						
レタス 非結球レタス 鱗莖類	べと病						
うり類	べと病、褐色腐敗病(すいか)						
トマト ミニトマト ピーマン さといも	疫病						
なす	褐色腐敗病						
非結球あぶらな科葉菜類	白さび病						
はくさい	べと病、白さび病、 ピシウム腐敗病						
だいこん	ワッカ症、白さび病						
かぶ	べと病、白さび病						
ほうれんそう はなやさい類	べと病	500	3ℓ/m ²	収穫前日まで但し、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	2回以内	2回以内	散布
みつば							
アスパラガス	疫病	500	50～100ml/株	※開花前まで	3回以内	3回以内	灌注
いちご							
てんさい	苗木枯病(アファノミセス菌) 苗木枯病(ピシウム菌)	500～ 1,000	ペーパーポット 1冊当たり1ℓ(3ℓ/m ²)	は種時～定植前	2回以内	2回以内	土壌灌注

※いちごの使用時期は開花前まで(開花後は使用しない)。

⚠️ 効果・薬害等の注意


- みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調整してください。
- 過度の連用をさけ、なるべく作用機構の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 本剤を使用しただいこんは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠️ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。
- 包装：500ml×20本

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2023年11月現在の登録内容に基づいています。

 **日本曹達株式会社**
〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
お問合せ (03) 3245-6178
(平日9～12時、13～17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容
SDSはこちら



農薬登録における
適用作物分類表