

# ナブ<sup>®</sup>乳剤

NABU

登録番号 第15992号

種類名 セトキシジム乳剤  
sethoxydim

除草剤分類 **1**

性状 淡褐色澄明可乳化液体

有効年限 4年

有効成分 セトキシジム 20.0%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

危険物 第四類第2石油類 危険等級III ポリアルキルベンゼン 火気厳禁

包装 500mℓ×20本、2ℓ×6本(北海道限定)

### ■特 長

1. イネ科植物に優れた殺草作用を発揮します。
2. 登録作物にかかっても影響がなく、ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
3. 浸透移行性に優れ、根まで枯殺します。
4. 散布液が乾けば降雨の影響はほとんどありません。
5. 土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。



最新の登録内容、  
SDSはこちら

### ■適用作物・雑草名及び使用方法

(2023年11月7日現在)

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		使用方法	本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数
			薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)		
ばれいしょ		イネ科雑草3～5葉期 収穫前日まで	150～200	100～150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回以内
		イネ科雑草6～8葉期 収穫前日まで	200	100		
てんさい	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ [ビラを除く])	(育苗期)イネ科雑草1～3葉期 収穫30日前まで	150～300 (0.3～0.6mℓ/ ペーパーポット6冊)	150 (300mℓ/ ペーパーポット6冊)		
		イネ科雑草6～8葉期 収穫30日前まで	200	100		
		イネ科雑草3～5葉期 収穫30日前まで	150～200	通常散布 50～150 少量散布 25～50		
	レッドトップ シバムギ		300～400	100～150		
だいず	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ [ビラを除く])	イネ科雑草3～5葉期 収穫30日前まで	150～200	通常散布 50～150 少量散布 25～50		
		イネ科雑草6～8葉期 収穫30日前まで	200	通常散布 50～100 少量散布 25～50		
		イネ科雑草9～10葉期 収穫30日前まで	250～300	100～150		
かんしょう ごぼう	イネ科雑草3～5葉期 収穫30日前まで	150～200				
		イネ科雑草6～8葉期 収穫30日前まで	200	100		

除 草 剤 ナブ乳剤

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		使用方法	本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数
			薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)		
やまのいも	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3～5葉期 収穫60日前まで	150～200	100～150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1回
		イネ科雑草6～8葉期 収穫60日前まで	200			
あずき いんげんまめ たまねぎ		イネ科雑草3～5葉期 収穫14日前まで	150～200	100		2回以内
		イネ科雑草6～8葉期 収穫14日前まで	200			
そば		イネ科雑草3～5葉期 収穫30日前まで	150～200	通常散布 50～150 少量散布 25～50		1回
		イネ科雑草6～8葉期 収穫30日前まで	200			
セルリー		イネ科雑草3～6葉期 収穫28日前まで	150～200	100～150		2回以内
にんじん		イネ科雑草3～5葉期 収穫14日前まで				
		キャベツ だいこん はくさい	イネ科雑草3～5葉期 収穫14日前まで	150～200		100
ブロッコリー			イネ科雑草3～5葉期 収穫7日前まで			
		ねぎ	イネ科雑草6～8葉期 収穫7日前まで	200		100
アスパラガス			イネ科雑草3～5葉期 収穫30日前まで			
		こんにゃく、なたね べにばないんげん	イネ科雑草6～8葉期 収穫30日前まで	200		100
かぼちゃ すいか、トマト やまのいも(むかご) 豆類(未成熟)			イネ科雑草3～5葉期 収穫前日まで			
	らっかせい	イネ科雑草6～8葉期 収穫前日まで	200			
えんどうまめ さいとも		イネ科雑草3～5葉期 収穫前日まで		150～200	100～150	
	いちご	イネ科雑草3～5葉期 収穫14日前まで	150～200			100～150
イネ科雑草3～5葉期		※収穫開始 14日前まで				

※いちごの使用時期は収穫開始14日前まで(収穫開始後は使用しない)。

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		使用方法	本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数	
			薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)			
カリフラワー もりあざみ 非結球あぶらな 科葉菜類、レタス ほうれんそう にんにく、かぶ にら しょうが 食用ゆり ぎぼうし せり とりかぶと (薬用) はっか おけら おうぎ しゃくやく (薬用) せんきゅう とうき みしまさいこ キノア 樹木類 きく、いぐさ すぎ、ひのき (床替床) わた りんどう チコリ チコリ (根株) 桑 たばこ 樹木等	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草 3~5葉期	収穫7日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1回
			収穫前日まで				
			収穫7日前まで	150	100~150	雑草茎葉散布	2回以内
			収穫30日前まで				
			収穫75日前まで	100	1回		
			収穫60日前まで				
			収穫14日前まで	100	10回以内 (1年間に) (2回以内)		
			収穫30日前まで				
			-	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回以内
			収穫60日前まで				
		収穫14日前まで	100	4回以内 (1年間に) (2回以内)			
		収穫30日前まで					
		収穫14日前まで	100	2回以内			
		収穫30日前まで					
		イネ科雑草3~5葉期	100~150	3回以内			
		イネ科雑草3~6葉期					
		根株養成期 イネ科雑草3~5葉期 但し 根株掘上30日前まで	100~150	2回以内			
		イネ科雑草3~5葉期 収穫30日前まで					
		草丈20~30cm	200~250	150~200	雑草茎葉散布	3回以内	
		植付10日前まで 又は植付後 10日から大土寄期まで	150~200	100~150	雑草茎葉 畦面散布	1回	
イネ科雑草3~5葉期	150~400	100~200	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内			
草丈40cm	500~ 1,000	150~200	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 局所散布				

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布してください。
3. 広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
4. 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7～10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
5. そば、だいず及びてんさいについて、10アール当りの使用量を25～50Lで散布する場合、少量散布に適合したノズルを使用してください。
6. 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
7. 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
  - (1) 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
  - (2) 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって、有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
  - (3) 水源池、養魚池等に飛散、流入しないよう十分に注意してください。
8. 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
9. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意 

10. 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲などのないように注意してください。
11. 原液は皮ふに対して刺激性があるので、皮ふに付着しないように注意してください。万一付着した場合には石けんでよく洗い落としてください。
12. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意してください。作業後は手足、顔など皮ふの露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
13. 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
14. 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

**水産動植物への影響：**水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用はさけてください。

**保管：**密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、保管してください。

○空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

●ナブ乳剤の上手な使い方

- ①冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合には、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
- ②イネ科作物には薬害があるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬剤が飛散しないように注意して散布してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。