

日曹アルファード[®]液剤

ALPHARD

登録番号 第24659号

種類名 トプラメゾン液剤

topramezone

除草剤分類 27

性 状 黄色～黄赤色澄明水溶性液体

有効年限 4年

有効成分 トプラメゾン 3.6%

毒 性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包 装 500mℓ×20本、3ℓ×6本

■特 長

1. 一年生イネ科雑草・一年生広葉雑草の幅広い草種に効果があります。
2. 有効成分「トプラメゾン」が作用し、白化させて枯らします。
3. イヌホオズキ・シロザ・イチビ・オオブタクサなどの問題雑草に卓効を示します。
4. 飼料用とうもろこしの各品種に影響が少なく高い選択性があります。



最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用作物・雑草名及び使用方法

(2023年12月1日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり 使用量		使用方法	本剤及びトプラメゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量 (mℓ)	希釈水量 (ℓ)		
飼料用とうもろこし	一年生雑草	とうもろこし 3～7葉期 但し、 収穫45日前まで	100～ 150	100～ 150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1回

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 飼料用とうもろこし用除草剤のため、食用とうもろこしには使用しないでください。
3. 周辺作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、飛散しないよう十分に注意して使用してください。
4. 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布してください。
5. 雑草生育期に有効ですが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので、時期を失しないよう均一に散布してください。
6. 散布直後の降雨は効果を低下させるので、天候に注意してください。
7. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

8. 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
9. 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
10. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

○空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

●日曹アルファード液剤の上手な使い方

①散布時の展開葉に薬害(黄斑)を生じる場合がありますが、その後の生育、収量には影響がありません。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。