

3ℓボトルで、大規模でも使いやすい！



飼料用とうもろこし**3～7葉期**に幅広く使用できます!!
優れた「除草力」と、高い「選択性」でしっかり守ります。

- ★一年生イネ科雑草・一年生広葉雑草の、幅広い草種に効果があります。★
- ★有効成分「トプラメゾン」が作用し、白化させて枯らします。★
- ★「イヌホオズキ」、「シロザ」、「イチビ」などの問題雑草にも優れた効果を示します。★
- ★飼料用とうもろこしの各品種に影響が少なく、高い選択性があります。★

■問題雑草をはじめ、幅広い雑草に優れた効果！



イチビ



イヌホオズキ



シロザ



タニソバ




ノビエ



適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	本剤および トブラメゾンを含む 農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量		
飼料用とうもろこし	一年生雑草	とうもろこし3~7葉期 但し、収穫45日前まで	100~150 mℓ/10a	100~150 ℓ/10a	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1回

上手な使い方



一年生イネ科雑草・一年生広葉雑草の、幅広い草種に優れた効果

幅広い殺草スペクトラム

除草効果/○:極大 ○:大 △:中~小 ×:小~無し

残草量対無処理比/○:1%未満 ○:1~10% △:11%~60% ×:61%以上

一年生雑草	イネ科							タデ科		キク科							シソ科	ザクロソウ科	ウリ科	アオイ科	ナデシコ科				ヒユ科			アブラナ科	スベリヒユ科	アカザ科	ツユクサ科	ナス科			カヤツリグサ科		
	メヒシバ	エノコログサ	イヌビエ	オシシバ	オオクサキビ	シャクタイケーン	スズメノカタビラ	イヌタデ	サナエタデ	タニソバ	ブタクサ	オオブタクサ	ハキダメギク	タカサブロウ	ハルジオン	オオオナモミ	ホトケノザ	ザクロソウ	アレチウリ	イチビ	ハコベ	ノミノフスマ	オオツメクサ	ノハラツメクサ	ハリビユ	アオビユ	ホソアオゲイトウ	ナスナ	スカシタゴボウ	スベリヒユ	シロザ	ツユクサ	イヌホオズキ	オオイヌホオズキ	ヒロハフウリンホオズキ	チヨウセンアサガオ	カヤツリグサ
100㎖	○	◎	○	◎	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	◎	◎	◎	◎	×
150㎖	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	×

△ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 飼料用とうもろこし用除草剤のため、食用とうもろこしには使用しないでください。
- 周辺作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、飛散しないよう十分に注意して使用してください。
- 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布してください。
- 雑草生育期に有効ですが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので、時期を失しないよう均一に散布してください。
- 散布直後の降雨は効果を低下させるので、天候に注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けさせてください。
 - 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 保管: 密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器等は圃場などに放置せず適切に処理してください。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容、
SDSはこちら

この資料は2023年9月現在の登録に基づいて作成しています。