

# ロムダン®フロアブル

ROMDAN

登録番号 第18999号

種類名 テブフェノジド水和剤  
tebufenozide

殺虫剤分類 18

性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体

有効年限 5年

有効成分 テブフェノジド 20.0%

毒 性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包 装 335mℓ×20本、500mℓ×20本

## ■特 長

1. キチン合成阻害剤や幼若ホルモン剤とは異なり、チョウ目幼虫に対して異常脱皮を誘発し、発育や摂食行動を抑制し、死に至らせます。
2. 残効性・耐雨性に優れ、幼虫の発育ステージにかかわらず高い効果を発揮します。
3. 既存剤に感受性が低下した害虫にも有効です。
4. 有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

最新の登録内容、  
SDSはこちら

## ■適用害虫名及び使用方法

(2023年11月20日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	テブフェノジド を含む農薬の 総使用回数	使用方法		
りんご	ハマキムシ類 キリガ類	1,500～ 3,000	200～ 700	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	散 布		
	ケムシ類 シャクトリムシ類	3,000						収穫7日 前まで	3回以内
ぶどう 小粒核果類	ケムシ類			2回以内	2回以内				
もも ネクタリン	ハマキムシ類					3回以内			
おうとう		ケムシ類		2回以内	2回以内				
なし	ドクガ類 ハマキムシ類	2,000				収穫21日 前まで		2回以内	2回以内
マンゴー	チャノコカクモンハマキ チャハマキ ヨモギエダシャク	1,000		摘採14日 前まで	2回以内	2回以内			
茶	ヨトウムシ	2,000		収穫14日 前まで				3回以内	3回以内
てんさい	ナカジロシタバ	2,000～ 3,000		収穫7日 前まで	3回以内	3回以内			
かんしょ	ハスモンヨトウ	2,000		収穫前日 まで				2回以内	2回以内
さといも さといも(葉柄) しょうが			収穫3日 前まで						
れんこん			収穫14日 前まで						
だいず			収穫前日 まで						
はくさい キャベツ レタス	2,000～ 4,000	2,000	2回以内	2回以内	2回以内				
いちご	2,000								

殺 虫 剤 ロムダンフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	テブフェノジド を含む農薬の 総使用回数	使用方法
にんじん	ヨトウムシ	2,000～ 4,000	100～ 300	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	散 布
そ ば ほうれんそう	ハスモンヨトウ	2,000		収穫21日 前まで			
ね ぎ	シロイチモジヨトウ			3,000	収穫7日 前まで	3回以内	
と う き	キアゲハ						
花 き 類・ 観 葉 植 物 (きくを除く)	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	1,000		発生初期	5回以内	5回以内	
き く	オオタバコガ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ						
樹 木 類	ケムシ類	2,000～ 3,000	200～ 700				

△ 効果・薬害などの注意 

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
3. カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
4. 蚕に対して長期間毒性があるので、養蚕地帯などでは使用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように十分注意して散布してください。
5. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
6. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

7. 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗いしてください。
8. 街路、公園などで使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：密栓し、直射日光をさけ、なるべく冷涼な所に保管してください。

○使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。