

2023年12月20日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2023年12月20日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹ベリマーク SC」

(農林水産省登録 第23559号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「キャベツ」、「はくさい」、「ブロッコリー」、「レタス」及び「非結球レタス」に、適用害虫名「ヨイモジヨウ」を追加。
2. 作物名「レタス」、及び「非結球レタス」に、適用害虫名「コナジラミ類」を、使用時期「定植当日」にて追加。
3. 作物名「こまつな」を、適用害虫名「アムシ」、「コナジラミ」、「アブラムシ類」、希釈倍数「4,000倍」、使用液量「0.2L/m²」、使用時期「収穫7日前まで」、使用方法「株元灌注」にて追加し、作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く)」を「非結球あぶらな科葉菜類」に変更。
4. 作物名「ピーマン」の適用害虫名「アブラムシ類」に、希釈水量「400株当たり200L(1株当たり500mL)」を使用時期「定植直後」及び使用方法「株元灌注」にて追加。
5. 作物名「ピーマン」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数を「4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)」に変更。
6. 作物名「なす」、「メロン」及び「すいか」の適用害虫名「アブラムシ類」に、希釈水量「400株当たり200L(1株当たり500mL)」を使用時期「定植直後」及び使用方法「株元灌注」にて追加。

—次ページへ続く—

【適用害虫名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアントラニ リプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ ラノメイガ アブ ラムシ類 アザ ミウマ類 ネキリムシ類 ウワバ 類 <u>シロイモシ ヨトウ</u>	400	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内)
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ ラノメイガ カブ ラハチ類 アブ ラムシ類 <u>シロイモシ ヨトウ</u>						4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ ラノメイガ アブ ラムシ類 アザ ミウマ類 <u>シロイモシ ヨトウ</u>						4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内)
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヒメフタテンヨコバ イ ハモク リバ イ類 アブ ラムシ類 ウワバ 類 <u>シロイモシ ヨトウ</u> <u>コオロギ 類</u>						4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
<u>非結球</u> <u>あぶらな科</u> <u>葉菜類</u>	アオムシ コナガ アブ ラムシ類	4,000	0.2L/m ²	収穫7日 前まで		株元 灌注	1回

—次ページへ続く—

【適用害虫名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニ リプロール を含む農薬の 総使用回数
		薬量	希釈水量				
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当り 25mL	400株当り 10~20L (1株当り25~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	<u>4回以内</u> <u>(定植時までの</u> <u>処理及び定植直後</u> <u>の株元灌注は</u> <u>合計1回以内、</u> <u>定植後の散布は</u> <u>3回以内)</u>
	400株当り 10L (1株当り25mL)						
	アブラムシ類		<u>400株当り</u> <u>200L</u> <u>(1株当り500mL)</u>	<u>定植直後</u>		<u>株元</u> <u>灌注</u>	
なす	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハメグリハエ類 ネキリムシ類	400株当り 25mL	400株当り 10~20L (1株当り25~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	1回
	アブラムシ類		<u>400株当り</u> <u>200L</u> <u>(1株当り500mL)</u>	<u>定植直後</u>		<u>株元</u> <u>灌注</u>	
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当り 25mL	400株当り 10~20L (1株当り25~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	1回
	アブラムシ類		<u>400株当り</u> <u>200L</u> <u>(1株当り500mL)</u>	<u>定植直後</u>		<u>株元</u> <u>灌注</u>	

以上

- 札幌営業所 (北海道) TEL:011-241-5581
- 仙台営業所 (東北) TEL:022-227-1741
- 関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川) TEL:048-677-6010
- 大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井) TEL:06-6229-7343
- 福岡営業所 (九州、沖縄) TEL:092-771-1336