

2023年12月20日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2023年12月20日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹セルカディスDフロアブル」

(農林水産省登録 第24315号)

### 【 変更内容の概要 】

1. 作物名「かんきつ」を追加。
2. 作物名「うめ」を追加。
3. 作物名「りんご」に希釈倍数「1,000 倍」を追加し「1,000～1,500 倍」に変更。
4. 作物名「ネクタリン」のフルキサピロキサドを含む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「3 回以内」に変更。
5. 使用上の注意事項に以下を追加。
  - (5) かんきつに使用する場合は次のことに注意すること。
    - ① 開花期以降のマシン油乳剤との混用散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけること。  
また開花期以降に本剤を使用する場合には、マシン油乳剤との散布間隔を30 日程度あけること。
    - ② 夏期以降の散布は果皮に薬害を生じるおそれがあるのでさけること。
    - ③ 収穫後長期間貯蔵する中晩柑に使用する場合は、貯蔵中、果皮に斑点が発生することがあるので、散布をさけること。
  - (11) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

—次ページへ続く—

【適用病害名・使用方法】

( 二重線太字 が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジチアノン を含む農薬の 総使用回数	フルキサピロ キサドを含む 農薬の 総使用回数
<u>かんきつ</u>	<u>そうか病</u> <u>黒点病</u> <u>灰色かび病</u>	<u>1,000~</u> <u>1,500</u>	200~ 700	<u>収穫30日 前まで</u>	<u>3回以内</u>	散布	<u>3回以内</u>	<u>3回以内</u>
<u>うめ</u>	<u>黒星病</u> <u>すす斑病</u>	<u>1,500</u>		<u>収穫14日 前まで</u>	<u>2回以内</u>		<u>2回以内</u>	
りんご	モニリア病 黒星病 斑点落葉病 黒点病 褐斑病 うどんこ病 赤星病 炭疽病 輪紋病	<u>1,000~</u> <u>1,500</u>		収穫60日 前まで	3回以内		3回以内	
ネクタリン	灰星病 黒星病 ホモプシス腐敗病 縮葉病 せん孔細菌病	1,500		収穫14日 前まで	2回以内		2回以内	

以上

札幌営業所 (北海道)	TEL:011-241-5581
仙台営業所 (東北)	TEL:022-227-1741
関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)	TEL:048-677-6010
大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井)	TEL:06-6229-7343
福岡営業所 (九州、沖縄)	TEL:092-771-1336