



殺虫剤

アクセルキング[®] プロアブル

幅広い害虫にキングのチカラ!!

適用拡大!



〈写真はイメージです〉



主な適用害虫

感受性の
低下した害虫に
幅広く効く



コナガ



アオムシ



ヨトウムシ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



ウワバ類



ハイマダラノメイガ



ネギアザミウマ



アブラムシ類



アブラムシ類



ナモグリバエ

特長

1 幅広い効果！

コナガ、アオムシ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、ナモグリバエなど幅広い害虫に優れた効果を発揮します。

2 既存剤抵抗性害虫に有効！

2つの有効成分の働きで、既存剤に感受性の低下した害虫にも安定した効果を示します。

■適用病害虫および使用方法

■が2018年5月に適用拡大になりました。

<2018年5月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ、ウワバ類 ハイマダラノメイガ アブラムシ類 ネギアザミウマ	1000倍						
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アブラムシ類、ナモグリバエ ネギアザミウマ			収穫 14日前まで	2回以内	散 布	2回以内	3回以内
レタス	オオタバコガ、アブラムシ類 ナモグリバエ、ハスモンヨトウ	1000～ 1500倍	100～ 300ℓ/10a			散 布		
	ヨトウムシ ウワバ類	1500倍						
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ、ネギアザミウマ	1000倍		収穫 7日前まで				2回以内
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類、オオタバコガ アザミウマ類							
きく	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	1000倍		発生初期	4回以内		4回以内	6回以内

■使用上の注意事項

- (1) 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- (2) レタスおよびはくさいの幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので使用をさせてください。
- (3) ばらには薬害を生じるおそれがあるので使用をさせてください。
- (4) 周辺作物(なす、トマト、きゅうり、かぶの幼苗期およびこまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜)にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かられないよう十分注意して散布してください。
- (5) 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にはからないようにしてください。
- (6) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にはからないようにしてください。
 - ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- (7) 天敵昆虫に対して影響があるので注意してください。
- (8) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- (9) 医薬用外劇物です。取扱いには十分注意してください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受け、また、誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- (10) 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- (11) 敷布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- (12) 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- (13) 敷布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084
<http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>