

秀品収穫は
苗美人
から。



新規登録拡大!
根回し水/
根じめ処理
(定植直後 株元灌注処理)
ピーマン、なす、メロン、
すいかなど

水やりと同様方法!



動噴で
(一般的な灌水スズリ式に比べ、
約500株をおおむね1分で
処理できます)

すばやく根から吸収される苗灌注1回で、速効食害停止&約1ヶ月残効!
悪い虫をつけさせない。

主な適用害虫



*株元灌注の場合は作物体になるべく薬液がかからないよう処理してください。

薬害事例ゼロ!	トマト	ミニトマト	きゅうり	なす
ピーマン	メロン	すいか	キャベツ	はくさい
ブロッコリー	レタス	ねぎ	ほうれんそう	いちご

野菜灌注用殺虫剤

ベジマーク® SC

powered by
CYAZYPYR®
ACTIVE INGREDIENT

ジアミド剤のプロ FMCの卓効成分
シアントラニプロール(通称:サイアジビル®)を、18.7%高配合!



- 特長 1** 卓効でおなじみのジアミド系有効成分シアントラニプロール(通称:サイアジピル®)を、ぜひたくに**18.7%配合!**
- 特長 2** まとめて**簡単&手間いらずの灌注処理**で、撒いたそばから**食害を停止させる速効性!**
- 特長 3** 幅広い**難防除・抵抗性・重要害虫**に有効!
約3~4週間の長い残効性!
- 特長 4** 発売以来、**薬害事例ゼロ!** マルハナバチ、天敵にも**高い安全性!**



NEW

定植直後の灌水(根回し水/根じめ)と、一緒に処理できて省力的!

トマト・きゅうり・なす・ピーマン・すいか・メロン苗の**根回し水/根じめ処理(定植直後 株元灌注処理)**

従来行っていた「植穴への殺虫剤処理」をスキップ。忙しい定植時期に、他の作業をこなす余裕が生まれます。

薬液を十分に吸収させましょう!

株元へ弱めの水圧でゆっくりといてねいに



薬量:400株当り25mℓ 希釈水量:400株当り200~200ℓ(1株当り50~500mℓ)

定植直後処理(根回し水処理、根じめ処理)による高い効果 トマト/タパコナジラミ ハイオタイプQ



2021年 熊本県農業研究センター 生産環境研究所 [試験概要] ◎品種:りんか09◎区画:1区(10株3連制)◎対象病害虫発生状況:中~多発生(成虫) ◎播種:4月9日◎定植:5月24日◎処理日:5月24日(A剤処理は5月21日)◎処理方法:ベリマークSCは400株当り原液25mℓ処理とするため、各株の株元に500倍に希釈した薬液500mℓを根回し水灌注処理した。定植3日前に、A剤は所定量を育苗ポットに処理した。◎処理時の作物のステージ:草丈40~50cm、本葉約8枚◎調査日:定植7日後(5月31日)、定植14日後(6月7日)、定植21日後(6月14日)、定植28日後(6月21日)◎調査方法:各区分株について、上・中・下位から3葉葉/株、合計18葉葉を選び、寄生する成虫および幼虫(中齢、老齢)を肉眼により計数した。

適用害虫と使用方法

2023年12月現在

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
きゅうり	アブラムシ類	400株当り25mℓ	400株当り2~20ℓ(1株当り5~50mℓ)	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類		400株当り10~20ℓ(1株当り25~50mℓ)	定植直後		株元灌注	
	アブラムシ類		400株当り20~200ℓ(1株当り50~500mℓ)	定植直後		株元灌注	
トマト ミニトマト	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、トマトキバガ	400株当り25mℓ	400株当り10~20ℓ(1株当り25~50mℓ)	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	コナジラミ類		400株当り20~200ℓ(1株当り50~500mℓ)	定植直後		株元灌注	
ピーマン	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	400株当り25mℓ	400株当り10~20ℓ(1株当り25~50mℓ)	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	コガネムシ類		400株当り10ℓ(1株当り25mℓ)	定植直後		株元灌注	
なす	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、ネキリムシ類	400株当り25mℓ	400株当り10~20ℓ(1株当り25~50mℓ)	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類		400株当り200ℓ(1株当り500mℓ)	定植直後		株元灌注	
メロン すいか	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	400株当り25mℓ	400株当り10~20ℓ(1株当り25~50mℓ)	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類		400株当り200ℓ(1株当り500mℓ)	定植直後		株元灌注	
ししとう	アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	400株当り25mℓ	400株当り10ℓ(1株当り25mℓ)	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類、ネキリムシ類、ウババエ類、シロイチモジヨトウ	400倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ			定植当日		4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ	400倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
レタス 非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヒメフタテンコバエ、ハモグリバエ類、アブラムシ類、ウババエ類、シロイチモジヨトウ			定植当日		4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	
カリフラワー	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ	2000倍	0.5ℓ/m ²	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
しそ	アブラムシ類			1回		4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	
ねぎ	タマネギバエ、タネバエ、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ネキリムシ類	2000倍	0.1ℓ/m ²	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ネキリムシ類			1回		4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	4000倍	0.2ℓ/m ²	収穫7日前まで	1回	株元灌注	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)
	シロオビノメイガ、アブラムシ類			1回		4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	
非結球 あぶらな科 葉菜類	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000倍	25~50mℓ/株	育苗期後半	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)
いちご	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、コナジラミ類、コガネムシ類			育苗期後半~定植当日		4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。 洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記録しましょう。

©2024 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, FMCO, を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
お問合せ (03)4212-9655
(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)

NO.555-2312TX



わかりやすい製品説明
動画はこちら



製品情報は
こちらから