日曹ファンタジスタ® 顆粒水和剤

FANTASISTA

登録番号 第23103号
種類名 ピリベンカルブ水和剤
pyribencarb
殺菌剤分類 11
性　状 淡褐色水和性細粒
有効年限 5年

有効成分 ピリベンカルブ　40.0%
毒　性 普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
包　装 （100g×25袋）×4箱、（166g×20袋）×2箱、500g×20袋、5kg×2袋（地域限定）

■特　長

1．予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
2．作物に対する安全性が高く、汚れが少ない薬剤です。
3．葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

最新の登録内容、SDS はこちら

■適用病害名及び使用方法　（2024年2月28日現在）

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量（ℓ/10a）	使用時期	本剤の使用回数	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数	使用方法
りんご	黒星病、モニリア病 褐斑病、すす点病 斑点落葉病 黒点病、輪紋病	3,000～4,000	200～700	収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布
	すす斑病、うどんこ病 炭疽病	3,000					
おうとう	灰星病、幼果菌核病 褐色せん孔病 黒斑病						
なし	炭疽病、褐色斑点病						
	黒斑病、輪紋病 黒星病 心腐れ症（胴枯病菌）	3,000～4,000					
かき	灰色かび病、落葉病 うどんこ病、炭疽病			収穫7日前まで			
ぶどう	灰色かび病 晩腐病、黒とう病			収穫14日前まで			
	さび病	3,000					
もも ネクタリン	うどんこ病			収穫前日まで			
	ホモプシス腐敗病 黒星病、灰星病	3,000～4,000					
小粒核果類（うめを除く）	灰星病、黒星病	3,000			2回以内	2回以内	
うめ							
	すす斑病、灰色かび病						
かんきつ	灰色かび病 そうか病、黒点病	2,000～4,000		収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
	炭疽病（さび果）	2,000					
キウイフルーツ	すす斑病 灰色かび病	4,000		収穫前日まで			

日曹の農薬

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量（ℓ/10a）	使用時期	本剤の使用回数	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数	使用方法
豆類（未成熟）（ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く）	菌核病、灰色かび病	2,000	100～300	収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布
えだまめ	灰色かび病、菌核病	2,000					
	紫斑病	2,000～4,000					
さやいんげん	菌核病、灰色かび病 炭疽病	2,000					
さやえんどう	灰色かび病、菌核病 さび病						
未成熟そらまめ	菌核病、灰色かび病 赤色斑点病、さび病						
豆類（種実）（ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く）	菌核病、灰色かび病			収穫7日前まで			
だいず	灰色かび病、菌核病						
	紫斑病	2,000～4,000					
あずき	さび病	2,000					
	菌核病、灰色かび病 炭疽病						
いんげんまめ							
えんどうまめ	灰色かび病、菌核病 さび病						
そらまめ	菌核病、灰色かび病 赤色斑点病、さび病						
アスパラガス	茎枯病、斑点病 褐斑病	3,000		収穫前日まで			
トマト ミニトマト	葉かび病 すすかび病、斑点病	2,000～3,000					
	菌核病、灰色かび病						
きゅうり							
なす	菌核病、灰色かび病 黒枯病、褐色斑点病						
	すすかび病 フザリウム立枯病 うどんこ病 褐色円星病、褐紋病	2,000					
いちご	灰色かび病	2,000～3,000					
	炭疽病	2,000					
にんじん	黒葉枯病、斑点病 菌核病、うどんこ病	3,000		収穫3日前まで			
はなやさい類	菌核病、黒すす病						
はくさい	菌核病、炭疽病 黒斑病、白斑病						

作物名	適用病害名	希釈倍数（倍）	使用液量（ℓ/10a）	使用時期	本剤の使用回数	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	菌核病、灰色かび病	2,000～3,000	100～300	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	散布
	黒斑病、根朽病 株腐病	2,000					
レタス	すそ枯病						
非結球レタス	菌核病、灰色かび病	2,000～3,000		収穫14日前まで			
	すそ枯病	2,000					
にら	白斑葉枯病 褐色葉枯病、さび病	3,000		収穫前日まで			
オクラ	葉すす病、灰色かび病	2,000					
にんにく	白斑葉枯病 黄斑病	3,000		収穫7日前まで			
	葉枯病 さび病						
ねぎ	小菌核腐敗病 黒斑病、小菌核病						
たまねぎ	灰色かび病※ 小菌核病	2,000～4,000	100～200	収穫前日まで	5回以内	5回以内 （定植前は1回以内）	
	灰色腐敗病	2,000～3,000					
		1,000～2,000	－	定植直前	1回		5分間苗根部浸漬
くきちしゃ	灰色かび病	3,000	100～300	収穫前日まで	2回以内	2回以内	散布
茶	炭疽病、新梢枯死症 輪斑病、褐色円星病		200～400	摘採7日前まで	1回	1回	
稲	いもち病	2,000	60～150	収穫30日前まで			
小麦	眼紋病、赤さび病			収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
	赤かび病	2,000～4,000					
花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）	灰色かび病	3,000	100～300	発病初期	5回以内	5回以内	
きく	灰色かび病 白さび病						
トルコギキョウ	灰色かび病 斑点病						

※北海道では通称「白斑葉枯病」と呼ばれています。

⚠効果・薬害などの注意

1．使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2．散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
3．なすに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
4．トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
5．スイトピーへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
6．カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。

7．蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
8．使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
9．適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠安全使用上の注意

10．眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
11．皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
12．使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。

水産動植物への影響：水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

【農薬をご使用の際は】

●使用前にはラベルをよく読んでください。
●ラベルの記載以外には、使用しないでください。
●小児の手の届く所には、置かないでください。
●空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。