

2024年2月28日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2024年2月28日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベルクートフロアブル」

(農林水産省登録 第19884号)

### 【 変更内容の概要 】

1. 作物名「レタス」を追加。
2. 作物名「チューリップ」に適用病害名「灰色かび病」を追加。
3. 作物名「かぼちゃ」の希釈倍数「1,000倍」を「1,000~2,000倍」に変更。
4. 作物名「みかん」の使用法「無人航空機による散布」の使用液量を以下のとおりに変更。
  - ・適用病害名「灰色かび病」について使用液量「4L/10a」及び「8L/10a」をそれぞれ「4~5L/10a」、「8~10L/10a」に変更。
  - ・適用病害名「貯蔵病害(青かび病)」及び「貯蔵病害(緑かび病)」について使用液量「5L/10a」及び「10L/10a」をそれぞれ「4~5L/10a」、「8~10L/10a」に変更。
5. 作物名「みかん」の使用法「無人航空機による散布」について使用時期「収穫3日前まで」を「収穫前日まで」に変更。
6. 作物名「チューリップ」の使用時期「発生初期」を「発病前~発病初期」に変更。
7. 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の適用病害名「灰色かび病」、「貯蔵病害(青かび病)」及び「貯蔵病害(緑かび病)」に使用法「無人航空機による散布」を追加。

—次ページへ続く—

【適用病害名・使用方法】

( 二重線太字 が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イミノクタジン を含む農薬の 総使用回数		
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1,000	200～ 700	<u>収穫前日</u> <u>まで</u>	3回以内	散布	3回以内		
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～ 2,000							
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 20	<u>4～5</u> <u>8～10</u>			無人航空機 による散布			
	かんきつ (みかんを 除く)	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1,000 1000～ 2,000					200～ 700	2回以内
		<u>灰色かび病</u> <u>貯蔵病害(青かび病)</u> <u>貯蔵病害(緑かび病)</u>	<u>10</u> <u>20</u>			<u>4～5</u> <u>8～10</u>		<u>無人航空機</u> <u>による散布</u>	
<u>レタス</u>	<u>菌核病</u>	<u>1,000</u>	<u>100～</u> <u>300</u>	<u>収穫14日</u> <u>前まで</u>	<u>3回以内</u>	<u>3回以内</u>			
かぼちゃ	うどんこ病	<u>1,000～</u> <u>2,000</u>	100～ 300	収穫7日 前まで	4回以内	散布	4回以内		
チューリップ	褐色斑点病 <u>灰色かび病</u>	1,000		<u>発病前～</u> <u>発病初期</u>	8回以内		8回以内		

以上

札幌営業所 (北海道) TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 (東北) TEL:022-227-1741  
 関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川) TEL:048-677-6010  
 大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井) TEL:06-6229-7343  
 福岡営業所 (九州、沖縄) TEL:092-771-1336