

2024年2月28日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2024年2月28日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹ファンタジスタ顆粒水和剤」

(農林水産省登録 第23103号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「茶」に適用病害名「褐色円星病」を追加。
2. 作物名「なす」に適用病害名「褐紋病」を追加。
3. 作物名「キャベツ」に適用病害名「株腐病」を追加。
4. 作物名「にら」に適用病害名「さび病」を追加。
5. 作物名「ねぎ」に適用病害名「小菌核病」を追加。
6. 作物名「オクラ」に適用病害名「灰色かび病」を追加。
7. 作物名「たまねぎ」の適用病害名「灰色腐敗病」に使用方法「5分間苗根部浸漬」を追加。
8. 作物名「たまねぎ」のピリベンカルブを含む農薬の総使用回数を「5回以内(定植前は1回以内)」に変更。
9. 「使用上の注意事項」(1)を以下のとおり変更、(6)を追加。
(1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ること。
(6) カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないこと。また、使用後14日間は入水しないこと。
10. 「安全上の注意事項」(2)を以下のとおり変更、(3)を追加。
(2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
(3) 使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
11. 「水産動植物への影響」に以下のとおり追加。
(3) 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

— 次ページへ続く —

【適用病害名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L /10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリベンカルブ を含む農薬の 総使用回数				
茶	新梢枯死症 炭疽病 輪斑病 <u>褐色円星病</u>	3,000	200～ 400	摘採7日前 まで	1回	散布	1回				
なす	うどんこ病 褐色円星病 すすかび病 ガリウム立枯病 <u>褐紋病</u>	2,000	100～ 300	収穫前日 まで	3回以内		3回以内				
	褐色斑点病 菌核病 黒枯病 灰色かび病	2,000～ 3,000									
	キャベツ	菌核病 灰色かび病		2,000～ 3,000				収穫3日前 まで			
		黒斑病 根朽病 <u>株腐病</u>		2,000							
にら	白斑葉枯病 褐色葉枯病 <u>さび病</u>	3,000		収穫前日 まで							
ねぎ	黒斑病 さび病 葉枯病 小菌核腐敗病 <u>小菌核病</u>	3,000		収穫7日前 まで							
	オクラ	葉すす病 <u>灰色かび病</u>		2,000				収穫前日 まで			
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	2,000～ 4,000		100～ 200				収穫前日 まで	5回以内	<u>5回以内</u> (<u>定植前は</u> <u>1回以内</u>)	
		2,000～ 3,000									
		<u>1,000～</u> <u>2,000</u>		<u>＝</u>				<u>定植直前</u>	<u>1回</u>		<u>5分間</u> <u>苗根部浸漬</u>

以上

札幌営業所 (北海道) TEL:011-241-5581
 仙台営業所 (東北) TEL:022-227-1741
 関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川) TEL:048-677-6010
 大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井) TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 (九州、沖縄) TEL:092-771-1336