

果樹・野菜の病害防除の定番!

登録作物  
40種類以上!

攻守に優れた  
ミラクルアシスト!!



殺菌剤

# 日曹 ファンタジースト<sup>®</sup>

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業（株）の登録商標



ナシ黒星病



モモ灰星病



インゲンマメ灰色かび病



キャベツ菌核病

## 特長

- 系統名ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸透性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。



日本曹達株式会社

適用病害と使用方法

が適用拡大部分

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、モニニア病、褐斑病、斑点落葉病、すす点病、黒点病、輪紋病	3000~4000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで 収穫7日前まで 収穫14日前まで 収穫前日まで 収穫14日前まで 収穫前日まで 収穫30日前まで 収穫14日前まで 収穫前日まで 収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	すす斑病、うどんこ病、炭疽病	3000倍					
	灰星病、幼果核病、褐色せん孔病、黒斑病	3000~4000倍					
	黒星病、黒斑病、輪紋病、心腐れ症(胴枯病菌)	3000倍					
	炭疽病、褐色斑点病	3000倍					
	かき	灰色かび病、落葉病、うどんこ病、炭疽病					
	ぶどう	灰色かび病、晚腐病、黒とう病					
	さび病	3000倍					
	もも	うどんこ病					
	ネクタリン	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病					
なし	すす斑病、灰色かび病	4000倍					
	かんきつ	灰色かび病、そうか病、黒点病					
	ぶどう	2000倍					
	さび病	2000倍					
	茶	炭疽病、輪斑病、新梢枯死症、褐色円星病					
	稻	いもち病					
	小麦	眼紋病、赤さび病					
	豆類(種実、ただし、だいす、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らんかせい、そらまめを除く)	赤かび病					
	あずき	菌核病、灰色かび病、炭疽病、さび病					
	いんげんまめ	菌核病、灰色かび病、炭疽病					
豆類(種実、ただし、だいす、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らんかせい、そらまめを除く)	そらまめ	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病					
	だいす	菌核病、灰色かび病					
	えんどうまめ	紫斑病					
	豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病、灰色かび病					
	さやいんげん	菌核病、灰色かび病、炭疽病					
	未成熟そらまめ	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病					
	えだまめ	菌核病、灰色かび病					
	さやえんどう	紫斑病					
	きゅうり	菌核病、灰色かび病、黒枯病、褐色斑点病					
	なす	2000倍					
トマト、ミニトマト	すすかび病、フザリウム立枯病、うどんこ病、褐色円星病、褐紋病	2000倍					
	いちご	炭疽病					
	キャベツ	菌核病、灰色かび病					
	はくさい	黒斑病、根朽病、株腐病					
	はなやさい類*	菌核病、黒すす病					
	レタス	菌核病、灰色かび病					
	非結球レタス	すそ枯病					
	にんじん	黒葉枯病、斑点病、菌核病、うどんこ病					
	アスパラガス	茎枯病、斑点病、褐斑病					
	ぐちしゃ	灰色かび病					
たまねぎ	オクラ	葉すす病、灰色かび病					
	ねぎ	小菌核腐敗病、さび病、黒斑病、葉枯病、小菌核病					
	灰色かび病、小菌核病	3000倍					
	灰色腐敗病	2000~4000倍	100~200ℓ/10a	収穫前日まで 収穫3日前まで 収穫7日前まで 定植直前	3回以内	散布	5回以内(定植前は1回以内)
	にんにく	葉枯病、白斑葉枯病、黄斑病、さび病					
	にら	褐色葉枯病、白斑葉枯病、さび病					
	花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	灰色かび病					
	きく	灰色かび病、白さび病					
	トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病					
	にんにく	皮膚に対する刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。					
	にら	皮膚に対する刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。皮膚に付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。					
	花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	皮膚に対する刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。					
	きく	皮膚に対する刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。					
	トルコギキョウ	皮膚に対する刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。					

\*はなやさい類とは：・ブロッコリー、茎ブロッコリー(スティックセニヨール)、・カリフラワー(はなやさい、さんごしょう、ロマネスク、カリフローレ)

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- なすに使用する場合、高溫条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさせてください。
- トマトの施設栽培で施設内が高溫多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
- スティックへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさせてください。
- カラー及び花はすすに使用する場合は、灌水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 茎に対して影響があるので周辺の桑葉にはかららないよ
- うにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



# 果樹・野菜の病害防除の定番

# 攻守に優れたミラクルアシスト