

発生させない、進ませない。

殺菌剤

KONAKESHI

コナケシ®

顆粒水和剤

果樹・小麦のうどんこ病、  
核果類の灰星病の予防に!



イメージキャラクター  
コナケシくん

特長

1 各種作物のうどんこ病に優れた効果を示す殺菌剤です。

2 優れた予防効果とともに、孢子形成阻害効果も有します。

3 既存剤耐性うどんこ病菌にも効力を示します。

®は日本曹達(株)の登録商標です。



日本曹達株式会社

■有効成分:シフルフェナミド…10.0%

殺菌剤分類 U6



■人畜毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルフェナミドを含む農業の総使用回数
りんご かき	うどんこ病	4000倍	200~700ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
なし ぶどう				収穫前日まで			
核果類	灰星病 うどんこ病(もも類)	2000~ 4000倍					
麦類	うどんこ病	4000倍	60~150ℓ /10a	収穫7日前まで			

※「核果類」にはもも類(もも、ネクタリン)、小粒核果類(あんず、うめ、すもも、小粒核果類に含まれる作物間の交配種)及びおうとうが含まれます。

## 試験成績



## 効果・薬害等の注意事項

- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
  - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
  - 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをしてください。
- 保管: 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。  
包装: (125g×20袋)×4箱

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。

2024年3月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容、SDSはこちら