

ベリマーク[®]SC

VERIMARK

登録番号 第24090号

種類名 シアントラニプロール水和剤
cyantraniliprole

殺虫剤分類 28

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

有効年限 4年

有効成分 シアントラニプロール 18.7%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装 (100mℓ×10本)×6箱

■特 長

1. ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナガ等のチョウ目害虫および、コナジラミ、アブラムシ、ネギアザミウマ、ナモグリバエ等の広範囲な害虫に卓効を示します。
2. 速やかに食害を停止させ、ウイルス媒介を抑制する効果も認められます。
3. 速やかな吸収移行性により長い残効性を示します。
4. 有用昆虫、周辺環境等に対する影響の少ない薬剤です。
5. 生育期の灌注処理に適した製剤で苗に対して高い安全性が確認されています。



■適用害虫名及び使用方法

(2024年3月12日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	シアントラニプロールを含む農薬の 総使用回数	使用方法
キャベツ	ヨトウムシ ネキリムシ類 ウワバ類	400	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5～4ℓ) 当り0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1回	4回以内 〔定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理 は3回以内〕	灌 注
	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ						
ブロッコリー	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ						
カリフラワー	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ						
はくさい	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ ウワバ類 シロイチモジヨトウ						
	コオロギ類						
レタス 非結球レタス	アブラムシ類						
しそ	タマネギバエ タネバエ	2,000	0.5ℓ/m ²	収穫7日 前まで	1回	4回以内 〔定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理 は3回以内 (但し、株元灌注 は1回以内)〕	株元灌注
ねぎ	シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ネキリムシ類						

殺 虫 剤 ベリマークSC

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	使用方法
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	2,000	0.1ℓ/m ²	収穫7日前まで	1回	1回	株元灌注
	シロオビノメイガ アブラムシ類	4,000	0.2ℓ/m ²				
非結球あぶらな科葉菜類	アオムシ コナガ アブラムシ類						
いちご	ハスモンヨトウ	1,000	25～50mℓ/株	育苗期後半	1回	4回以内 灌注は1回以内、散布は3回以内	灌注
	アザミウマ類 コナジラミ類 コガネムシ類		50mℓ/株	育苗期後半～定植当日			
	アブラムシ類		25～50mℓ/株				

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	使用方法
		薬量	希釈水量				
きゅうり	アブラムシ類	400株当り 25mℓ	400株当り 20～200ℓ (1株当り 50～500mℓ)	定植直後	1回	4回以内 定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内	株元灌注
			400株当り 2～20ℓ (1株当り 5～50mℓ)	育苗期後半～定植当日			灌注
	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400株当り 10～20ℓ (1株当り 25～50mℓ)				
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 トマトキバガ	400株当り 25mℓ	400株当り 20～200ℓ (1株当り 50～500mℓ)	定植直後	1回	4回以内 定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内	株元灌注
	コナジラミ類		400株当り 200ℓ (1株当り 500mℓ)				
ピーマン	アブラムシ類	400株当り 25mℓ	400株当り 10～20ℓ (1株当り 25～50mℓ)	育苗期後半～定植当日	1回	4回以内 定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内	灌注
	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400株当り 10ℓ (1株当り 25mℓ)				
	コガネムシ類						

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	使用方法		
		薬量	希釈水量						
なす	ネキリムシ類 ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当り 25mℓ	400株当り 10～20ℓ (1株当り 25～50mℓ)	育苗期後半 ～定植当日	1回	1回	灌 注		
	アブラムシ類		400株当り 200ℓ (1株当り 500mℓ)	定植直後				株元灌注	
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400株当り 10～20ℓ (1株当り 25～50mℓ)	400株当り 10ℓ (1株当り 25mℓ)			育苗期後半 ～定植当日	4回以内 〔灌注は1回 以内、散布 は3回以内〕	灌 注
			400株当り 10ℓ (1株当り 25mℓ)						

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用前によく振ってから使用してください。
2. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
3. 薬液調製後はできるだけ速やかに使用してください。
4. アルカリ性の農薬や肥料との混用はさけてください。
5. 本剤は土壌表面に処理することで効果を発揮することから、株元灌注を行う場合には、作物の株元に処理出来る時期に処理してください。
6. 過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
7. 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
8. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
9. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

10. 誤飲などのないよう注意してください。
11. 使用の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。

水産動植物への影響：水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。処理器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。