

2024年3月13日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2024年3月13日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トップジンM水和剤」

(農林水産省登録 第11573号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「つつじ類」、「かし」、「さくら」、「じんちょうげ」、「ぼけ」、「ポプラ」及び「いぬつげ」を削除し、作物名「樹木類(つつじ類、かし、さくら、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげを除く)」を「樹木類」に変更。
2. 作物名「みかん」及び「かんきつ(みかんを除く)」に適用病害名「貯蔵病害(黒斑病)」を追加。
3. 作物名「小粒核果類」に適用病害名「すす斑病(うめ)」を追加。
4. 作物名「ブロッコリー」に適用病害名「根朽病」を追加。
5. 作物名「メロン」に適用病害名「菌核病」を追加。
6. 作物名「ピーマン」に適用病害名「炭疽病」を追加。
7. 作物名「ねぎ」について以下のとおり変更。
 - ・使用方法「散布」に適用病害名「萎凋病」、「黒腐菌核病」及び「小菌核病」を追加。
 - ・使用方法「苗床灌注」に適用病害名「萎凋病」及び「黒腐菌核病」を追加。
8. 作物名「樹木類」に適用病害名「褐斑病(つつじ類)」、「幼果菌核病(さくら)」、「紫かび病(かし)」、「黒点病(じんちょうげ)」、「褐斑病(ぼけ)」、「マルゾニナ落葉病(ポプラ)」、「枝枯病(いぬつげ)」及び「赤枯病(すぎ)」を追加。
9. 作物名「くり」の希釈倍数「1,000倍」を「1,000~1,500倍」に変更。
10. 使用上の注意事項を、以下のとおり変更。
 - (4) かんきつの貯蔵病害防除に使用する場合には、収穫前3週間以内〔かんきつ(みかんを除く)の場合には収穫前2~3週間の間〕に1回散布すると効果的である。

—次ページへ続く—

【適用病害名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオファネートメチル を含む農薬の 総使用回数
みかん	そうか病	30	8L/10a	4~6月	5回以内	空中散布	8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人航空機散布は 合計5回以内)
	灰色かび病 そうか病	1,000~ 1,500					
	<u>貯蔵病害(黒斑病)</u>	<u>2,000</u>					
	貯蔵病害(軸腐病)	2,000~ 3,000					
かんきつ (みかんを 除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	<u>2,000</u>	200~700 L/10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	8回以内 (塗布は3回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計5回以内)
	<u>貯蔵病害(黒斑病)</u>						
小粒核果類	<u>すす斑病(うめ)</u>	<u>1,000</u>	200~700 L/10a	収穫21日 前まで	3回以内	散布	すももは6回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、 生育期の散布は 3回以内)、 その他の小粒核果類は 6回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内)
	灰星病 環紋葉枯病 葉炭疽病 黒星病 黒粒枝枯病	1,000~ 1,500					
くり	実炭疽病	<u>1,000~ 1,500</u>	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	4回以内	散布	7回以内 (散布は4回以内、 塗布は3回以内)
ブロッコリー	菌核病 <u>根朽病</u>	2,000	100~300 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	3回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は2回以内)
メロン	つる枯病 陥没病 <u>菌核病</u>	1,500~ 2,000		収穫前日 まで	3回以内		

適用病害名・使用方法

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオファネートメチル を含む農薬の 総使用回数
ピーマン	黒枯病 <u>炭疽病</u>	4,000～ 6,000	100～300 L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は3回以内)
ねぎ	<u>萎凋病</u> <u>黒腐菌核病</u> <u>小菌核病</u> 小菌核腐敗病	1,000		収穫7日 前まで	3回以内		5回以内 (種子への処理は 1回以内、 苗根部浸漬及び 苗床灌注は 合計1回以内、 散布及び 株元散布は 合計3回以内)
	<u>萎凋病</u> <u>黒腐菌核病</u> 小菌核腐敗病	250	チェーン ポット1冊 (30×60cm、 土壌量約5L) 当り0.5～1L	定植直前	1回	苗床灌注	
	萎凋病 小菌核腐敗病	20	—		3分間 苗根部 浸漬		
<u>樹木類</u>	炭疽病	1,000～ 2,000	200～700 L /10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
	<u>褐斑病(つつじ類)</u> <u>幼果菌核病(さくら)</u>	<u>1,000～</u> <u>1,500</u>					
	うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症(シュート' サ-コスボ' ラ菌)	1,000					
	<u>紫かび病(かし)</u> <u>黒点病(じんちょうげ)</u> <u>褐斑病(ぼけ)</u> <u>マルゾニナ落葉病(ポプラ)</u> <u>枝枯病(いぬつげ)</u> <u>赤枯病(すぎ)</u>						

以上

札幌営業所 (北海道) TEL:011-241-5581
 仙台営業所 (東北) TEL:022-227-1741
 関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川) TEL:048-677-6010
 大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井) TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 (九州、沖縄) TEL:092-771-1336