

日曹 **スカウト**<sup>®</sup> フロアブル  
SCOUT

登録番号 第17253号  
種類名 トラロメトリン水和剤  
tralomethrin

殺虫剤分類 **3A**

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体  
有効年限 4年

有効成分 トラロメトリン 1.4%  
毒性 医薬用外劇物  
包装 (100mℓ×10本)×6箱、500mℓ×20本

■特 長

1. 低薬量で広い範囲の害虫に対して有効です。
2. 優れた速効性があり安定した効果が長続きます。
3. 収穫間近まで使用できます。



最新の登録内容、  
SDSはこちら

■適用害虫名及び使用方法

(2024年3月13日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤及びトラロメ トリンを含む 農薬の総使用回数	使用方法	
りんご	ハマキムシ類、キンモンホソガ シンクイムシ類	2,000	200～700 ℓ/10a	収穫前日 まで	5回以内	散 布	
	アブラムシ類、ギンモンハモグリガ カメムシ類	1,500～ 2,000					
おうとう	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ	3,000					2回以内
ラズベリー	オウトウショウジョウバエ						
ブルーベリー	ヒロヘリアオイラガ						
なし	カメムシ類	1,500					5回以内
	アブラムシ類	1,500～ 2,000					
もも	ナシチビガ、シンクイムシ類	2,000					3回以内
	アブラムシ類	2,000～ 3,000					
ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類	2,000～ 3,000					3回以内
	アブラムシ類	2,000					
すもも	シンクイムシ類	2,000		1回			
	アブラムシ類	2,000～ 3,000					
うめ	カメムシ類	2,000		5回以内			
	アブラムシ類	2,000					
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	アブラムシ類	2,000～ 3,000		3回以内			
	カメムシ類	1,500					
	アザミウマ類	2,000					
かき	アザミウマ類	2,000	3回以内				
	カキノヘタムシガ	1,500～ 2,000					
	ハマキムシ類、コガネムシ類成虫	2,000					
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	2,000～ 3,000	3回以内				
	アザミウマ類	2,000					
いちじく	アザミウマ類	2,000	3回以内				
びわ	アブラムシ類	2,000	収穫前日 まで				
	ビワキジラミ		収穫3日 前まで				

殺 虫 剤 日曹スカウトフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及びトラロメトリンを含む農薬の総使用回数	使用方法			
キウイフルーツ	キイロマイコガ	1,500～2,000	200～700 ℓ /10a	収穫前日まで	5回以内	散 布			
かんきつ (みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ	2,000～4,000		収穫3日前まで					
みかん	ミカンハモグリガ								
はくさい	ハイマダラノメイガ	2,000	100～300 ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内				
キャベツ	アブラムシ類	1,500～3,000							
	コナガ、アオムシ								
	ヨトウムシ								
レタス	タマナギンウワバ	2,000							
	ハイマダラノメイガ								
アスパラガス	アブラムシ類	1,500～3,000							
にんじん	ヨトウムシ	2,000					100～300 ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)	アブラムシ類								
チンゲンサイ	ヨトウムシ								
だいこん	カブラハバチ								
やまのいも	ナガイモコガ								
ブロッコリー	ヨトウムシ								
なばな類	ハイマダラノメイガ								
きゅうり	ヨトウムシ	3,000	100～300 ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内				
	オンシツコナジラミ	2,000～3,000							
なす	アブラムシ類	1,500～3,000	100～300 ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内				
すいか		2,000							
メロン		2,000							
たまねぎ	ネギアザミウマ	2,000～3,000							
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1,500							
ばれいしょ	アブラムシ類	2,000	100～300 ℓ /10a	収穫前日まで	5回以内				
	テントウムシダマシ								
しょうが	ジャガイモガ								
茶	アワノメイガ	1,500	200～400 ℓ /10a	摘採7日前まで	3回以内				
	チャノミドリヒメヨコバイ	3,000							
	チャノホソガ								

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及びトラロメトリンを含む農薬の総使用回数	使用方法
花き類・観葉植物 (宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)	アブラムシ類	2,000～3,000	100～300 ℓ/10a	—	5回以内	散布
グラジオラス トルコギキョウ	アザミウマ類	2,000				
宿根かすみそう	ヨトウムシ	2,000～3,000	100～700 ℓ/10a	—	5回以内	散布
りんどう	アブラムシ類					
りんどう	ヒラズハナアザミウマ	2,000	200～700 ℓ/10a	—	5回以内	散布
つつじ類	ツツジゲンバイ					
芝	シバツトガ スジキリヨトウ	1,500	200～300 mℓ/m <sup>2</sup>	発生初期	5回以内	散布

### △ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. りんごのキンモンホソガの防除に使用する場合、幼虫期では効果が劣るので成虫最多発生期に散布するよう特に留意してください。
3. みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
4. カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
5. ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - (1) ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - (2) 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - (3) 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
6. 蚕に対しては長期間毒性があるので、桑葉にかからないようにしてください。
7. かんきつ・茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
8. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
9. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

### △ 安全使用上の注意

10. 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体の異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
11. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
12. かゆみを生じる場合があるので注意してください。
13. 散布の際は、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
14. 街路、公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

**治療法：**本剤による中毒の治療法としては動物実験で、メトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。

**水産動植物への影響：**水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川などに流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

**保管：**密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、カギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

---

○空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

---

#### **散布液調製法**

※粘性があるので、あらかじめ少量の水でよく溶かしてから、所定量の水に溶かし、よく攪拌してください。ボルドー液と混用する場合は、必ず本手順を守ってください。

---

#### **【農薬をご使用の際は】**

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。