

2024年5月15日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2024年5月15日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

### 【 変更内容の概要 】

1. 作物名「ブルーベリー」に適用病害名「根腐疫病」を追加。
2. 作物名「りんご」の適用病害名「黒星病」に使用方法「落葉に散布」を追加。
3. 作物名「りんご」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)」に変更。
4. 「使用上の注意事項」を、以下のとおり変更。
  - (10) 本剤を土壌灌注する場合は、次の事項に注意すること。
    - ① 白紋羽病、紫紋羽病に使用する場合は、樹幹から半径1m程度の範囲を掘り上げて根部を露出させ、病根を除去した後所定濃度の薬液を灌注し埋め戻すか、半径1m程度の範囲に土壌灌注機を用いて所定量の薬液を灌注すること。但し土壌灌注機による灌注は予防的使用か軽症樹に限って行うこと。
    - ③ 適用の範囲内で、樹の大きさにより灌注水量を調節すること。
  - (16) 落葉に散布で使用する場合は、ほ場内で落葉に対して均一に散布すること。

—次ページへ続く—

【適用病害名・使用方法】

( 二重線太字 が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナム を含む農薬の 総使用回数
ブルーベリー	白紋羽病 <u>根腐疫病</u>	500	50~100 L/樹	収穫21日前 まで	1回	土壌灌注	1回
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病 褐斑病	2,000~ 2,500	200~700 L/10a	収穫45日前 まで	1回	散布	<u>2回以内</u> <u>(散布または</u> <u>落葉に散布は</u> <u>1回以内、</u> <u>土壌灌注は</u> <u>1回以内)</u>
	黒星病	<u>1,000~</u> <u>2,000</u>	<u>100~200</u> <u>L/10a</u>	<u>落葉後~</u> <u>展葉期まで</u>		<u>落葉に</u> <u>散布</u>	
	輪紋病 モニア病	2,000	200~700 L/10a	収穫45日前 まで		散布	
	白紋羽病 紫紋羽病	500	50~100 L/樹			土壌灌注	
		1,000	100~200 L/樹				

以上

札幌営業所 (北海道)	TEL:011-241-5581
仙台営業所 (東北)	TEL:022-227-1741
関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)	TEL:048-677-6010
大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井)	TEL:06-6229-7343
福岡営業所 (九州、沖縄)	TEL:092-771-1336