

無人航空機
散布に対応

農林水産省登録
第21917号

殺虫剤

日曹 フェニックス[®]

顆粒水和剤

効き目が長いから「安心」!!



アオムシ



ハスモンヨトウ



オオタバコガ



ハイマダラノメイガ

適用拡大!!

ばれいしょ/ジャガイモガ

無人航空機散布

とうもろこし、ヤングコーン
/ツマジロクサヨトウ

はくさい、レタス、

非結球レタス、ねぎ

(32倍 3.2ℓ/10a)

てんさい(80倍 3.2ℓ/10a)



写真はイメージです

野菜・果樹のチョウ目害虫防除に!

2023年12月適用拡大

適用病害虫および使用方法

〈2023年12月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数
もも、ネクタリン	ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、ケムシ類	4000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
おうとう	ハマキムシ類						2回以内
小粒核果類(うめ、すももを除く)	ケムシ類						3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
うめ							2回以内
すもも	シンクイムシ類、ケムシ類	4000~6000倍					2回以内
なし	ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類						
りんご	ハマキムシ類	4000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
ぶどう	ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ケムシ類			収穫7日前まで			2回以内
かき	カキノヘタムシガ、イラガ類			収穫前日まで			
かんきつ	ミカンハモグリガ、ハマキムシ類、ケムシ類、アゲハ類			収穫7日前まで			
キウイフルーツ	ハマキムシ類	32倍	3.2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
とうもろこし、ヤングコーン	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
飼料用とうもろこし(子実)	アワノメイガ、オオタバコガ	32倍	3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
そば	ハスモンヨトウ	2000~6000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで		散布	
キャベツ	ヨトウムシ、オオタバコガ、アオムシ、コナガ、 ハスモンヨトウ、ウバ類	16倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内)
		20倍	2ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
メキャベツ	アオムシ、コナガ、ウバ類	2000倍	100~ 300ℓ /10a			散布	3回以内
はくさい	オオタバコガ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、 ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内)
		20倍	2ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
カリフラワー	コナガ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a			散布	2回以内
ブロッコリー	ヨトウムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		20倍	2ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	コナガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a			散布	2回以内
チンゲンサイ	コナガ、ハスモンヨトウ						
レタス	ウバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	16倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、散布 及び無人航空機散布は 合計2回以内)
		20倍	2ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
非結球レタス		2000~4000倍	100~300ℓ/10a			無人航空機 による散布	2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				
		20倍	2ℓ/10a				
		32倍	3.2ℓ/10a				
		2000~4000倍	100~300ℓ/10a			散布	

→裏面につづく



日本曹達株式会社

®は日本農業(株)の登録商標

