

べと病・疫病の専用剤

殺菌剤

ベトファイター®

顆粒水和剤



ベトファイター顆粒水和剤は、コルテバ・アグリサイエンス社のシモキサニル、
およびクミアイ化学工業(株)のベンチアバリカルブイソプロピルを
有効成分として含有しています。

殺菌剤

ベトファイター®
顆粒水和剤有効成分：シモキサニル・・・・・・・・・・24.0%
ベンチアバリカルブインプロピル・・・・10.0%

殺菌剤分類 27,40

人畜毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

① 予防効果と残効性

持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。

② 初期感染抑制効果

すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病徴発現前)であっても、発病を抑制できます。

③ 浸達・移行性

植物内外で安定した防除効果が期待できます。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	シモキサニルを含む 農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブインプロピル を含む農薬の総使用回数	使用方法
ぶどう	べと病	2,000～3,000	200～700	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	散布
きゅうり			100～300	収穫前日まで			3回以内	
すいか	収穫3日前まで	4回以内		3回以内				
メロン	べと病					収穫14日前まで		
ねぎ		収穫7日前まで				3回以内		
たまねぎ		白色疫病		収穫14日前まで				
らっきょう	疫病			2,000～3,000		4回以内		
トマト ミニトマト	褐色腐敗病	2,000				3回以内		
なす	疫病	2,000		2回以内		5回以内		
かぼちゃ	茎疫病	2,000～3,000		2回以内		2回以内		
だいず	べと病	1,500～2,000		2回以内	2回以内			
ばれいしょ	疫病	2,000～3,000	100～180	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	
たばこ								

上手な使い方

- 疫病、べと病は病気の進展が速いため、初期対策が重要です。
- 予防的な散布に加え、初発段階までに確実に抑えることで感染拡大しないように心掛けましょう。
- 耐性菌管理のため、作用機作が異なる薬剤をローテーション散布してください。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ボルドー液等のアルカリ性農薬との混用はさけてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整してください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 薬液や薬液タンクの洗浄廃液は放置せず、速やかに安全な場所に処理してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年9月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)

最新の登録内容
SDSはこちら