

コナケシ[®] 顆粒水和剤

KONAKESHI

登録番号 第24044号
 種類名 シフルフェナミド水和剤
 cyflufenamid
 殺菌剤分類 U6
 性状 褐色水和性細粒
 有効年限 4年

有効成分 シフルフェナミド 10.0%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装 (125g×20袋)×4箱

■特 長

1. 各種作物のうどんこ病に優れた効果を示す殺菌剤です。
2. 優れた予防効果とともに、孢子形成阻害効果も有します。
3. 既存剤耐性うどんこ病菌にも効力を示します。



最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2024年3月4日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ /10a)	使用時期	本剤及びシフル フェナミドを含む 農薬の総使用回数	使用方法
りんご	うどんこ病	4,000	200～700	収穫7日前まで	2回以内	散布
なぶどう				収穫前日まで		
核果類	灰星病 うどんこ病(もも類)	2,000～ 4,000		収穫前日まで		
麦類	うどんこ病	4,000	60～150	収穫7日前まで		

※「核果類」にはもも類(もも、ネクタリン)、小粒核果類(あんず、うめ、すもも、小粒核果類に含まれる作物間の交配種)及びおうとうが含まれます。

△ 効果・薬害などの注意

1. 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
2. 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節してください。
3. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
4. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

△ 安全使用上の注意

5. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
6. 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
7. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。