

殺菌剤

ブロードワン®

顆粒水和剤

灰色かび病と菌核病の同時防除に!

トップジンM

+

フルピカ

効果の高い二つの薬剤をひとつにしました。灰色かび病の耐性菌対策に!



きゅうり/灰色かび病



トマト/灰色かび病



なす/灰色かび病



レタス/灰色かび病



きゅうり/菌核病



トマト/菌核病



なす/菌核病



レタス/菌核病



日本曹達株式会社

殺菌剤

ブロードワン[®] 顆粒水和剤

包装：500g×20袋

[有効成分]

チオファネートメチル…56.0% メバニピリム…13.3%

殺菌剤分類 1.9

[人畜毒性]

普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)



特長

- 幅広い殺菌スペクトラムを有し浸透移行性・予防効果・治療効果を合わせ持つ「トップジンM」と、優れた予防効果と残効性を有する「フルピカ」の混合薬剤です。
- 既存剤に耐性を発達させた灰色かび病にも優れた効力を示します。

適用病害及び使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	メバニピリムを含む農薬の総使用回数	使用方法
きゅうり トマト ミニトマト なす	灰色かび病 菌核病	1,500	100~300	収穫前日まで	4回以内	6回以内 (種子への処理は1回以内、 は種後は5回以内)	4回以内	散布
				収穫7日前まで	2回以内			
あずき	炭疽病 灰色かび病	1,000	—	収穫 14日前まで	4回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、 は種後は4回以内)	5回以内	
	菌核病	800~1,000						
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病 菌核病	1,000						

試験成績



効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤を使用した場合には、ペノミルを含む剤を使用しないでください。ただし、種子への処理、種かへへの処理及び塗布処理は除きます。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない涼涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容、SDSはこちら

本資料は2024年10月現在の登録内容に基づいています。