

日曹ファンタジスタ[®]フロアブル

FANTASISTA

登録番号 第24014号

種類名 ピリベンカルブ水和剤
pyribencarb

殺菌剤分類 11

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

有効年限 4年

有効成分 ピリベンカルブ 18.7%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装 500mℓ×20本

■特長

1. 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
2. だいずの紫斑病に高い防除効果を示します。
3. 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
4. 作物への汚れや薬害発生リスクが少ない薬剤です。
5. 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。
6. 薬液調製に便利なフロアブル製剤で無人航空機による散布も可能です。

最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2024年10月30日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	ピリベンカルブ を含む農薬の 総使用回数	使用方法		
だ い ず	紫斑病 菌核病 褐色輪紋病	1,000 ～ 2,000	100 ～ 300	収穫 7 日前 まで	3 回以内	3 回以内	散布		
		16	0.8				無人航空機 による散布		
小 麦	赤かび病	2,000	60 ～ 150	収穫 14 日前 まで			3 回以内	3 回以内	散布
かんきつ	灰色かび病		200 ～ 700						

△効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 使用に際しては、容器をよく振ってください。
3. 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
4. 本剤を無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
 - (1) 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施してください。
 - (2) 少量散布(0.8ℓ/10a)の場合は、少量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - (3) 無人航空機による散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - (4) 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
 - (5) 散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意してください。
 - (6) 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
5. 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。
6. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
7. 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△安全使用上の注意

8. 誤飲などのないよう注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
9. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

○空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗淨水はタンクに入れてください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。