

ブロードワン 顆粒水和剤

BROADONE

登録番号 第21034号

種類名 チオファネートメチル・メパニピリム水和剤
thiophanate-methyl・mepanipyrim

殺菌剤分類 1,9

性 状 淡褐色水和性細粒

有効年限 4 年

有効成分 チオファネートメチル 56.0%、メパニピリム 13.3%

毒 性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包 装 1 kg×10袋(北海道限定)、500g×20袋(北海道を除く)

■特 長

- 幅広い殺菌スペクトラムを有し浸透移行性・予防効果・治療効果を合わせ持つ「トップジン M」と、優れた予防効果と残効性を有する「フルピカ」の混合薬剤です。
- 既存剤に耐性を発達させた灰色かび病にも優れた効力を示します。

最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2024 年 10 月 7 日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ /10a)	使用時期	本剤の 使用回数	チオファネート メチルを含む農業 の総使用回数	メパニピリム を含む農業の 総使用回数	使用方法
あ ず き	炭疽病 灰色かび病	1,000	—	収穫14日 前まで	4 回以内	5 回以内 〔種子への処理 は1回以内、 は種後は 4回以内〕	5 回 以 内	散布
	菌核病	800～ 1,000						
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病 菌核病	1,000						
きゅうり トマト ミニトマト なす	灰色かび病 菌核病	1,500	100～ 300	収穫前日 まで	2 回以内	6 回以内 〔種子への処理 は1回以内、 は種後は 5回以内〕	4 回 以 内	
レタス				収穫7日 前まで		4 回以内 〔種子への処理 は1回以内、 灌注は1回以内、 散布は2回以内〕	2 回以内	

⚠ 効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使ってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤を使用した場合には、ベノミルを含む剤を使用しないでください。ただし、種子への処理、種籾への処理及び塗布処理は除きます。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。