

トップジン[®]M 粉剤DL

TOPSIN-M

登録番号 第22103号

種類名 チオファネートメチル粉剤
thiophanate-methyl

殺菌剤分類 1

性状 類白色粉末 45 μm以下
浮遊性指数20以下

有効年限 4年

有効成分 チオファネートメチル 2.0%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装 3 kg×8袋、20kg×1袋(地域限定)

■特 長

1. ドリフトレス (DL) タイプの粉剤なので、粉立ちや飛散が大幅に軽減され、作業者に対する安全性が高い薬剤です。
2. 水での希釈が不要なので省力的に散布ができます。
3. 植物体への付着性能がすぐれ、安定した病害防除効果を示します。

最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2024 年 10 月 7 日現在)

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	いもち病	3～4 kg/10a	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内 〔種子への処理は 1回以内〕	散 布
小麦	赤かび病			3回以内 〔出穂期以降 は2回以内〕	4回以内 〔種子への処理は 1回以内、散布 及び無人ヘリ 散布は合計3回 以内、出穂期 以降は2回以内〕	
麦類 (小麦を除く)				3回以内 〔出穂期以降 は1回以内〕	3回以内 〔種子への処理は 1回以内、出穂期 以降は1回以内〕	
だいず	紫斑病	4kg/10a		4回以内	4回以内 〔種子への処理は 1回以内〕	
らっかせい	褐斑病		5回以内 〔種子への処理は 1回以内、 は種後は4回以内〕			
れんこん		3～4 kg/10a	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	
キャベツ	菌核病	4kg/10a	収穫3日 前まで	2回以内	3回以内 〔種子への処理は 1回以内、 は種後は2回以内〕	
レタス		3kg/10a	収穫7日 前まで		4回以内 〔種子への処理は 1回以内、 灌注は1回以内、 散布は2回以内〕	

殺 菌 剤 トップジンM粉剤DL

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法
ご ぼ う	菌核病	3kg/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	4 回以内 〔 種子への処理は 1 回以内、 は種後は 3 回以内 〕	散 布
ね ぎ	小菌核腐敗病	9kg/10a			5 回以内 〔 種子への処理は 1 回 以内、苗根部浸漬及び 苗床灌注は合計 1 回 以内、散布及び株元 散布は合計 3 回以内 〕	株元散布 (散布後 土寄せ)
す い か	炭疽病	4kg/10a	収穫前日 まで	5 回以内	6 回以内 〔 種子への処理は 1 回以内、 は種後は 5 回以内 〕	散 布
こんにゃく	乾腐病	種いも重量 の 2 ～ 3%	植付前	1 回	1 回	種いも 粉衣

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
2. 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を 1 目盛程度絞って散布してください。
3. だいたいの紫斑病に対しては落花後～若莢期に 2 ～ 3 回散布してください。
4. こんにゃくの種いも粉衣を行う場合は、適当な容器の中で本剤が均一にいもに粉衣するよう少量ずつていねいにまぶしてください。湿粉衣はさけ、粉衣した種いもはそのまま植付けてください。なお、薬剤処理した種いもは、食糧、飼料として用いないよう十分注意してください。
5. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
6. 本剤の連続使用によって、薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
7. 本剤を使用した場合には、ペノミルを含む剤を使用しないでください。ただし、種子への処理、種糞への処理及び塗布処理は除きます。
8. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

9. 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
10. 使用の際は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
11. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
12. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封して、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。