

果樹・野菜の病害防除の定番に!!

登録作物
40種類以上!

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!



殺菌剤

日曹 **ファンタジスタ**®

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



ナシ黒星病



モモ灰星病



インゲンマメ灰色かび病



キャベツ菌核病



特長

- 系統名ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。



日本曹達株式会社



果樹・野菜の病害防除の定番に!!

攻守に優れたミラクルアシスト

適用病害と使用方法

が適用拡大部分

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用流量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、モニリア病、褐斑病、 斑点落葉病、すす点病、黒点病、輪紋病	3000～4000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	3回以内
おうとう	すす斑病、うどんこ病、炭疽病	3000倍					
な し	黒星病、黒斑病、輪紋病、心腐れ症（胴枯病菌）	3000～4000倍					
か き	炭疽病、褐色斑点病	3000倍					
ぶどう	灰色かび病、落葉病、うどんこ病、炭疽病	3000～4000倍		収穫7日前まで 収穫14日前 まで			
も も	灰色かび病、晩腐病、黒とう病	3000倍					
ネクタリン	さび病、うどんこ病	3000倍		収穫前日 まで			
キウイフルーツ	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病	3000～4000倍					
かんきつ	すす斑病、灰色かび病	4000倍		収穫14日前 まで			
小粒核果類（うめを除く）	灰色かび病、そうか病、黒点病	2000～4000倍					
う め	炭疽病（さび果）	2000倍	200～400ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
茶	灰星病、すす斑病、灰星病、黒星病	3000倍					
稲	いもち病	2000倍	60～150ℓ /10a	摘採7日前まで 収穫30日前まで	1回	1回	
小 麦	眼紋病、赤さび病	2000～4000倍					
豆類（種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く）	菌核病、灰色かび病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
あずき	菌核病、灰色かび病、炭疽病、さび病						
いんげんまめ	菌核病、灰色かび病、炭疽病						
そらまめ	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病						
だいず	菌核病、灰色かび病	2000～4000倍		収穫前日 まで			
えんどうまめ	紫斑病						
豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く）	菌核病、灰色かび病						
さやいんげん	菌核病、灰色かび病、炭疽病						
未成熟そらまめ	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病	2000倍		収穫前日 まで			
えだまめ	菌核病、灰色かび病						
さやえんどう	紫斑病						
きゅうり	菌核病、灰色かび病、さび病						
な す	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病	2000～3000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	
ピーマン	菌核病、灰色かび病						
トマト、ミニトマト	菌核病、灰色かび病、黒枯病、褐色斑点病						
いちご	菌核病、灰色かび病、黒枯病、褐色斑点病						
キャベツ	すすかび病、フザリウム立枯病、うどんこ病、褐色円星病、楊紋病	2000倍		2000倍			収穫3日前 まで
はくさい	斑点病						
はなやさい類*	菌核病、灰色かび病、葉かび病、すすかび病、斑点病						
レタス	菌核病、灰色かび病						
非結球レタス	すすかび病	4000倍		2000～3000倍			収穫14日前 まで
にんじん	菌核病、黒すす病						
アスパラガス	菌核病、灰色かび病						
くさしや	菌核病、灰色かび病						
オクラ	すそ枯病	2000～3000倍	2000～3000倍	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
ね ぎ	菌核病、灰色かび病						
たまねぎ	菌核病、灰色かび病、うどんこ病						
にんにく	黒葉枯病、斑点病、菌核病、うどんこ病						
に ら	茎枯病、斑点病、褐斑病	3000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	3回以内	
花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）	灰色かび病						
き く	葉すす病、灰色かび病、うどんこ病						
トルコギキョウ	葉すす病、灰色かび病、うどんこ病						
ね ぎ	小菌核腐敗病、さび病、黒斑病、葉枯病、小菌核病、黒腐菌核病、白絹病	3000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	5回以内（株元 灌注は2回以内、 散布は3回以内）	
たまねぎ	黒腐菌核病						
にんにく	黒腐菌核病						
に ら	灰色かび病、小菌核病						
花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）	灰色かび病	2000～4000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内（株元 灌注は1回以内）
き く	灰色かび病、白さび病						
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病						
ね ぎ	灰色腐敗病						
にんにく	葉枯病、白斑葉枯病、黄斑病、さび病	2000～4000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで 収穫前日まで	3回以内	散布	5回以内
に ら	褐色葉枯病、白斑葉枯病、さび病						
花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）	灰色かび病						
き く	灰色かび病、白さび病						
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病	2000～3000倍	100～300ℓ /10a	定植直前	1回	5分間苗根部浸漬 5分間セル苗浸漬	5回以内
ね ぎ	灰色腐敗病						
にんにく	葉枯病、白斑葉枯病、黄斑病、さび病						
に ら	褐色葉枯病、白斑葉枯病、さび病						
花き類・観葉植物（きく、トルコギキョウを除く）	灰色かび病	3000倍	100～300ℓ /10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
き く	灰色かび病、白さび病						
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病						
ね ぎ	灰色腐敗病						

*はなやさい類とは：・ブロッコリー・茎ブロッコリー(スティックセニョール)、・カリフラワー(はなやさい、さんごしょう、ロマネスコ、カリフラワー)

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に
合わせて調整してください。
- なすに使用する場合は、高温条件下で果実に薬害を生じるお
それがあるので使用をさけてください。
- トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じ
るのでおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってくだ
さい。
- スイピーへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけて
ください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、灌水状態で使用しな
いってください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 室に対して影響があるので、周辺の桑葉にはからさないよう
うにしてください。

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用す
る場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分
確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関
係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らな
いように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関
係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してくだ
さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指導を受け
てください。使用後は洗顔してください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意
してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落
としてください。

- 使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣な
どを着用してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用
しないでください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきって
ください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さな
いください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響
を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与
えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷蔵・乾
燥した場所に保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は園場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2024年11月現在の登録内容に基づいています。



最新の登録内容
SDSはこちら



特設サイト