


でっかい効果!




ミツバチ・マルハナバチに
影響が少ない薬剤です。

害虫防除の新戦略

モスピラン®

顆粒水溶剤





■適用害虫と使用方法

*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びアセタミプリドを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用 時期*	総使用回数*	
					本剤	アセタミプリド
りんご	アブラムシ類、シンクイムシ類、キンモンホソガ キンモンハモグリガ、カメムシ類、リンゴウタムシ	2,000~4,000	200~700	前日	3回	3回
	カイガラムシ類、モモチョッキリゾウムシ コガネムシ類成虫	4,000				
	ケムシ類、キリガ類	2,000				
なし	アブラムシ類、シンクイムシ類 カキノヒメヨコバイ、カイガラムシ類、カメムシ類	2,000~4,000		14日	1回	1回
	ナシホソガ	4,000				
	カイガラムシ類、アザミウマ類 フタデンヒメヨコバイ、コガネムシ類成虫	2,000~4,000				
ぶどう	ツマグロアオカスミカメ、トビイロトラガ ブドウトラカミキリ	2,000		収穫後秋期	3回	3回
	カイガラムシ類、クビアカツヤカミキリ	2,000				
	オウトウショウジョウバエ、カメムシ類	2,000~4,000				
おうとう	アザミウマ類	4,000		前日	1回	1回
	コスカシバ、カイガラムシ類、クビアカツヤカミキリ	2,000				
	アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類	2,000~4,000				
もも	アザミウマ類、カメムシ類、コガネムシ類成虫	2,000~4,000		3日	3回	3回
	モモチョッキリゾウムシ	4,000				
	アブラムシ類	2,000~4,000				
ネクタリン 小粒核果類 (すもも、うめを除く)	カイガラムシ類、クビアカツヤカミキリ	2,000		前日	3回	3回
	アブラムシ類	2,000~6,000				
	ケシキスイ類、ノコメトガリキリガ	2,000				
うめ	カイガラムシ類、クビアカツヤカミキリ	2,000		35日 前日	3回	3回
	シンクイムシ類、アブラムシ類、スモミハバチ	2,000~4,000				
	アブラムシ類、カミキリムシ類	2,000				
すもも	カイガラムシ類、ビウキジラミ	2,000		14日	3回	3回
	アザミウマ類、キボシカミキリ、カイガラムシ類	2,000				
	イチジクヒトリモドキ	2,000				
マングロー カキ	アザミウマ類、カイガラムシ類	2,000~4,000		30~75	7日	2回 2回
	アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ	4,000				
	カイガラムシ類、カキノヘタムシガ、カメムシ類	2,000				
かんきつ	アブラムシ類、ゴマダラカミキリ成虫	2,000~4,000		200~700	7日	3回(樹幹注入は1回)
	カイガラムシ類、ミカンハモグリガ、ミカンバエ	2,000				
	コナジラミ類	4,000				
さるなし オリーフ	ゴマダラカミキリ※1	200~400		200~700	7日	2回 1回
	クワシロカイガラムシ	2,000				
	カメムシ類	2,000				
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ	2,000~4,000		200~700	7日	3回(樹幹注入は1回)
	カイガラムシ類	2,000				
	コナジラミ類	4,000				
レインシ コレシ	ナシヒメシンクイ	2,000		200~700	7日	2回
	カイガラムシ類	2,000				
	アブラムシ類、カイガラムシ類	4,000				
かりん パッションフルーツ	クリミガ、クリシギゾウムシ	2,000~4,000		200~700	7日	3回(樹幹注入は1回)
	モモノゴマダラノメイガ	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
あけび(果実) アセロラ	アブラムシ類	4,000		200~700	7日	2回 2回
	オウトウショウジョウバエ	4,000				
	アブラムシ類、アザミウマ類	200				
ブルーベリー さんしょう(葉)	ゴマダラカミキリ幼虫※2	200		200~700	7日	4回(散布は1回、樹幹散布は3回)
	センノカミキリ	2,000				
	グンバイムシ類	2,000				
さんしょう(果実)	クビアカツヤカミキリ、グンバイムシ類	2,000		200~700	7日	5回(樹幹注入は1回)
	グンバイムシ類	2,000				
	ヤナギコハモグリ	2,000~4,000				
たらのぎ 樹木類(まつ、やなぎ、さくらを除く)	アブラムシ類	4,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000~4,000				
	アブラムシ類	2,000				
さくら	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
やなぎ	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
まなこ	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
茶	チャノミドリヒメヨコバイ	4,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	チャノキイロアザミウマ、チャノホソガ	4,000				
	アブラムシ類	2,000				
てんさい※3	テンサイトビハムシ	200		200~700	7日	3回(苗床灌注は1回)
	テンサイモグリハナバエ	200				
	アブラムシ類	200				
びゃくし おけら	アゲハ類	2,000~4,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アザミウマ類	4,000				
とんき なんでん(葉)	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
ソルガム	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
飼料用とうもろこし まめ科牧草	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
いね科牧草	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
しょうようほおずき	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用ゆり	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用花(食用ぎく、食用 ミニバラ、食用金魚草、 食用プリムラを除く)	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用ぎく	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用ミニバラ	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用金魚草	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用プリムラ	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
食用さくら(葉)	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
花き類・観葉植物 (ストック、りんどうを除く)	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
ストック	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
りんどう	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
キャベツ	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
はくさい	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
ブロッコリー	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
カリフラワー	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
レタス	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
非結球レタス	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
うり類(漬物用)	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				
ザーサイ	アブラムシ類	2,000		200~700	7日	3回(定植後は2回)
	アブラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000				


使い方:散布

※1 かんきつのゴマダラカミキリに対する200~400倍液の使用は、主幹

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用 時期*	総使用回数*		
					本剤	アセタミプリド	
だいこん	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ	2,000	100～300	14日	1回	1回	
	アブラムシ類、カブラハバチ	2,000～4,000		7日			
はつかだいこん	アブラムシ類	2,000		21日			
わさびだいこん	コナガ			7日			
かぶ	アブラムシ類、キスジノミハムシ カブラハバチ	4,000		7日			
非結球あぶらな科 菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類、キスジノミハムシ、カブラハバチ			14日			
チンゲンサイ				前日			
なばな類				45日			
茎ブロッコリー		7日					
なたね	アブラムシ類	2,000		前日			
メキャベツ		7日					
非結球メキャベツ		7日					
トレビス		7日					
ふだんそう、エンサイ	アブラムシ類	4,000		7日	2回	2回	
くきちしゃ、おかひじき				14日			
しそ、しそ(花穂)				3日			
タラゴン				14日			
クレソン	アブラムシ類	8,000		3日	2回	2回	
しゅんぎく				7日			
ほうれんそう				7日			
なすな、ははこぐさ				3日			
パセリ	アブラムシ類、シロオビノメイガ	4,000～8,000		3日	1回	1回	
アマランサス(莖葉)				21日			
タイム、バジル				14日			
チャービル、ディル(葉)				7日			
セーシ	アブラムシ類	8,000	前日	3回	3回		
レモンバーム			前日				
つるな			前日				
マジヨラム			前日				
はっか、オレガノ	アブラムシ類、ウリハムシ	4,000	7日	2回	2回		
にがうり、オクラ			前日				
メロン			3日				
まくわうり			3日				
かぼちゃ	アブラムシ類、ウリハムシ	4,000	100～300	前日	2回	2回	
	2,000～4,000	2回			3回		
	カボチャミバエ、ウリノメイガ	2,000			3回	4回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回、 散布及び定植後の株元散布は合計2回)
	ウリハムシ	4,000					
	コナジラミ類、ウリノメイガ	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000～4,000					
	ウリノメイガ、コナジラミ類	2,000			3日	4回	4回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回)
	ウリハムシ	4,000					
	コナジラミ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000～4,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000～4,000		前日		2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000		前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)	
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000		前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)	
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回 (粒剤の定植時までの処理は1回 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回)		
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000					
	アブラムシ類、ア						

使い方:散布 ※4 みつばの収穫7日前まで但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで

害虫防除の新戦略



モスピラン[®] 顆粒水溶剤

農林水産省登録
第22583号

●有効成分：アセタミプリド・・・20.0% 殺虫剤分類 4A ●人畜毒性：医薬用外劇物

●幅広い効果

各種作物の重要害虫に、幅広く、優れた効果を発揮します。

●浸透移行性

優れた浸透移行性により、巻葉性のアブラムシや潜葉性のハモグリガに有効です。

●ミツバチ・マルハナバチに影響が少ない

●粉立ちが少なく、使いやすい

⚠️ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- なしに使用する場合、品種により葉に黒変の薬害を生じることがあるので注意してください。
 - ①薬害が認められた事例がある品種
長十郎、新高、八雲及び愛甘水
 - ②薬害が認められていない品種
二十世紀、新水、幸水、豊水、新星、ゴールド二十世紀、新興、晩三吉、愛宕、新雪、今村秋、新世紀、豊月、秋甘泉、新甘泉、なつひめ、あきづき、涼月、夏さやか、おさゴールド、王秋、秋栄、筑水、八里、多摩、南水、越後錦、秋水、長寿、幸菊、ラ・フランス、ル レクチエ、マルグリット及びヤーリー
- ぶどうに対しては、幼果期から果粒肥大期の散布は、果粉の溶脱のおそれがあるので使用はさけ、新梢伸長期から落花期及び袋かけ以降に使用してください。
- メロン、うり科作物に対しては葉縁に薬害を生じるおそれがあるので、使用濃度、使用量を厳守し、幼苗期や高温時の使用をさけてください。
- かんきつに対して希釈倍数200～400倍で使用する場合、薬液が葉にかかる薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
- スモモミハバチに対して使用する場合は開花盛期から落弁期までの間に使用してください。
- 蚕に対しては長期間毒性があるので、近くに桑園のある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠️ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
- 使用の際は、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに洗眼してください。
- 本剤の中毒に対しては、動物実験でL-メチオニン製剤、グリチルリチン製剤及びグルタチオン製剤の注射投与が有効であるとする報告もあります。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に、小児や、使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう、縄囲いや、立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物への影響：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布後は水管理に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に、カギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は警察に届け出てください。

⚠️ 注意 コナガ・アブラムシは抵抗性が発達しやすいので、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用し、連続散布はさけてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2021年9月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9～12時、13～17時、土日祝祭日を除く)

NO.662-2109Z