

殺ダニ剤

農林水産省登録
第16094号

ニッソラン[®]水和剤

有効成分：ヘキシチアゾクス………10.0%

殺虫剤分類 10A

人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

果樹・野菜・花のハダニ防除に

特長

- 本剤は殺卵力を有し、残効性に優れます。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用が可能です。
- 各種作物に薬害の心配の少ない薬剤です。
- 天敵、有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です（蚕を除く）。




日本曹達株式会社

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤及びヘキシチアゾクス を含む農薬の総使用回数	使用 方法
かんきつ	ミカンハダニ	2,000～4,000	200～700	収穫7日前まで	2回以内	散布
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ	2,000～3,000				
なし、ぶどう	ハダニ類				3,000	
もも、おうとう、かき		2,000～3,000				
うめ				100～300		
びわ、いちじく			2回以内			
いちご、なす、きゅうり にがうり、ピーマン さやえんどう、実えんどう					収穫14日前まで	
さやいんげん、すいか、かぼちゃ						
未成熟ふじまめ		収穫21日前まで				
未成熟さげ、ししとう				収穫14日前まで		
えだまめ			収穫7日前まで			
あずき					収穫3日前まで	
だいず、てんさい						
かんしょ		200～700				
メロン				100～300		
ホップ			1回			
食用ぎく					2回以内	
しそ	—					
しそ(花穂)		2回以内				
さんしょう(葉)				2回以内		
花き類・観葉植物			2回以内			

圃場での効力発現モデル



△ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に、かけ残のないようにていねいに散布してください。
- 本剤は殺卵力、殺幼虫力は強いですが、成虫に対する効果が乏しく、効果の発現には夏期で3～7日、春秋期の低温期では7～10日を要することがあるので十分注意してください。
- 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の薬剤との輪番で使用してください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、灌水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

- 粉末は、眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗いしてください。
- 保管・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない、冷涼・乾燥した所に保管してください。
- 包装：(100g×25袋)×4箱、500g×20袋

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

