

新登場!

農林水産省登録 第24936号

殺菌剤

フセキワイド® フロアブル

ピリダクロメチル
含有

うどんこ病に新たな一手

- うどんこ病に優れた効果を示します。
- 既存薬剤の耐性菌*にも有効な新規作用機作のピリダクロメチルと、耐性菌リスクが低いイミノクタジナルベシル酸塩との混合剤です。
*QoI剤、DMI剤、SDHI剤耐性菌などで確認。
- トマトの葉かび病やすすかび病、なすのすすかび病にも優れた効果を示します。
- 天敵・有用昆虫に対して影響が少ない薬剤です。



上手な使い方

- 予防的な使用で高い効果を示すことから、うどんこ病の発生前から発生初期に使用してください。
- 本剤を連用(連続散布)せず、作用性の異なる薬剤とのローテーション散布をしてください。

治療痕について

- 優れた予防効果に加え、治療効果(病斑進展阻止効果、分生子形成阻害効果)も有します。
- 病斑が見えている状態で散布すると治療痕が残る場合がありますが、この状態から病斑が拡大したり、分生子が形成されることはありません。



ピリダクロメチル処理区



無処理区

適用病害の範囲及び使用方法

2025年3月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	ピリダクロメチルを含む農薬の総使用回数
トマト	うどんこ病 すすかび病	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
ミニトマト	うどんこ病 すすかび病				2回以内		2回以内	
なす	うどんこ病 すすかび病				3回以内		3回以内	
きゅうり	うどんこ病 つる枯病				4回以内		7回以内	
すいか							4回以内	
メロン							5回以内	
いちご							10回以内（育苗期は5回以内、 本圃では5回以内）	

試験事例

きゅうり うどんこ病に対する防除効果



●試験場所:三浦県農業研究所(2022年) ●圃場:施設 ●品種:シャープ1
●区制:1区10株、3連制 ●発生条件:多発生、9/16に初発確認。
●散布:9/20、27、10/4 ●調査:10/11に各区100葉の発病程度を調査。

いちご うどんこ病に対する防除効果



●試験場所:滋賀県農業技術振興センター(2023年) ●圃場:施設
●品種:章姫 ●区制:1区14株、3連制 ●発生状況:多発生(接罹)
●散布日:4/4、12、18、26 ●調査:5/2に各区全体の上位展
葉3枚葉の小葉ごとの発病程度を調査。 ●接罹:4/4に分生子
を各株に払い落とした。その後、発病株を区間上部に吊り下げた。

トマト すすかび病に対する防除効果



●試験場所:熊本県農業研究センター生産環境研究所(2023年)
●圃場:施設 ●品種:かれん ●区制:1区10株、3連制 ●発生状況:
少発生(接罹)、6/27に初発確認。 ●散布日:6/27、7/4、11、18
●調査:7/25に各区100葉の発病程度を調査。 ●接罹:6/8に分生子
懸濁液を噴霧接種。接種後は夕方に通路散水し、夜間はハウスを閉めた。

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ薬液を調整し、使いきってください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬のため、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲で使用してください。
- 効果期のメロンに対して葉害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするのと同時に衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は燃焼等に放置せず適切に処理してください。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)

