

ベリマーク®SC 混用・近接処理事例

2023年2月9日

ベリマークSC協議会

混用事例

農薬名	キ ャ ベ ツ	は く さ い	ブ ロ ッ コ リ ー	レ タ ス	ね ぎ	い ち ご
オラクル顆粒水和剤		●	●			●
ダイアジノンSLゾル						●
トップジンM水和剤					●	
パレード20フロアブル	●	●		●	●	
フロンサイドSC						●
ベンレート水和剤					●	●
モベントフロアブル						●
ランマンフロアブル						●
リドミルゴールドMZ						●

近接処理事例（灌注）

農薬名	キ ャ ベ ツ	は く さ い	ブ ロ ッ コ リ ー	レ タ ス	ト マ ト	き ゆ う り	な す	ね ぎ
オーソサイド水和剤80						●		
オラクル粉剤	●	●	●					
オリゼメート粒剤	●	●	●	●		●		
ダコニール1000			●	●	●	●		
トリフミン水和剤								●
ネビジン粉剤		●	●					
ネマキック粒剤					●	●	●	
ネマトリンエース粒剤					●	●	●	
フォース粒剤	●	●	●	●				
ランマンフロアブル	●	●	●					

近接処理事例（株元灌注）

農薬名	ね ぎ
アフエットフロアブル	●

【記号の説明】

●：問題なかった

※1：近接処理（灌注）の場合、ベリマークSCは定植7日前～前日に灌注処理。対照剤は定植当日処理。

※2：近接処理（株元灌注）の場合、ベリマークSC、対照剤ともに生育期の同日処理。

本表は実施した試験をもとに作成しておりますが、品種、栽培条件、使用濃度、使用時期などにより結果が異なる場合があります。したがって、本表で●であっても「薬害がない」ということを保証するものではありません。あくまでも混用知見の一例として考えていただきますようお願いいたします。