


よくわかる！

**病害虫防除
マニュアル
きゅうり編**

そーだ、
にほんそーだに
そーだんしょう！



日本曹達株式会社




きゅうり病害虫図鑑

病害

【灰色かび病 *Botrytis cinerea*】

病斑上の病原菌や、地表面に菌核として残った病原菌が、伝染源となる。次期作では、そこから孢子が飛散して伝染する。



灰色のかびが密生する 発病幼果 発病茎
適用薬剤 ミギワ10フロアブル、ブロードワン顆粒水和剤 など

【褐斑病 *Corynespora cassiicola*】


発病茎葉や農業資材などに付着した病原菌が、長期に生存して伝染源となる。葉に黄褐色の円形小斑点を生じ、後に同心円紋の大型病斑を生じる。



小型病斑 小型・大型混在病斑 発病後期
適用薬剤 ゲッター水和剤 など

【うどんこ病 *Golovinomyces cucurbitacearum, Leveillula taurica, Podosphaera xanthii*】


うり類が周年栽培される地域では、次々に伝染が繰り返される。晩秋に子のう殻が形成され、翌年の伝染源となる。やや乾燥した条件で発生しやすい。



発病中期 発病後期 発病後期 (葉脈に沿った病斑)
適用薬剤 バンチョTF顆粒水和剤、ベルクートフロアブル など

【菌核病 *Sclerotinia sclerotiorum*】

地表面に落ちた菌核が伝染源となる。次期作では、そこから孢子が飛散して伝染する。果実、茎、葉に白色綿状のかびを形成し、後にネズミ糞状の菌核を生じる。



被害程度の異なる発病果 発病果に生じた菌核 発病茎に生じた菌核
適用薬剤 トップジンM水和剤、ファンタジスタ顆粒水和剤 など

【べと病 *Pseudoperonospora cubensis*】

病原菌は発病葉で越冬する。きゅうりの周年栽培されている地域では、常時孢子が飛散しているため発生しやすい。葉に葉脈で区切られた多角形の黄色病斑を生じる。



発病初期 発病中期 発病後期
適用薬剤 ビシロックフロアブル、ベトファイター顆粒水和剤 など

【炭疽病 *Colletotrichum orbiculare*】

病原菌は発病茎葉や支柱に付着して越冬し、翌年の伝染源となる。葉に淡褐色の円形病斑を生じる。葉の病斑は内部がへこみ、穴が空きやすい。果実にも窪んだ病斑を生じる。



発病初期 発病中期 発病後期
適用薬剤 ミギワ10フロアブル、ゲッター水和剤 など

害虫

【ワタアブラムシ *Aphis gossypii*】

葉や果実からの吸汁により、作物の生育が抑制。果実への寄生による品質低下を招き、モザイク病の媒介をする。



有翅成虫と無翅成虫 体長1.5mm 新葉の寄生状況
適用薬剤 モスピラン顆粒水溶剤 など

【オンシツコナジラミ *Trialeurodes vaporariorum*】


幼虫および成虫の葉からの吸汁により、作物の生育が抑制。排泄物によってすす病が発生、黄化病の媒介をする。



3齢幼虫(0.5mm)と4齢幼虫(0.8mm) 成虫 (全長1.5mm) オンシツコナジラミの排泄物によるすす病
適用薬剤 モスピラン顆粒水溶剤 など

【ミナミキイロアザミウマ *Thrips palmi*】

幼虫および成虫が、葉および果実を食害。黄化えそ病の媒介をする。



雌成虫(体長1.2mm) 2齢幼虫(上)と雄成虫(下) 食害により葉裏が銀色に変色
適用薬剤 コテツフロアブル など

【ワタヘリクロノメイガ(ウリノメイガ) *Diaphania indica*】

幼虫により、葉や果実・茎が食害される。



若齢幼虫(体長4mm) 老齢幼虫(体長16mm) 成虫(体長15mm)
適用薬剤 コテツフロアブル など

【ナミハダニ *Tetranychus urticae*】

加害により、葉の表面に白点を生じ、増殖すると葉が萎縮し枯れる。



卵(直径0.15mm)、第1若虫(0.25mm)、第2若虫(0.35mm) 多発し巣網が張られた葉 成虫(体長0.5mm) 被害葉
適用薬剤 ダニオーテフロアブル、コテツフロアブル など

【ハスモンヨトウ *Spodoptera litura*】

幼虫により、葉および果実が食害される。



中齢幼虫(体長13mm) 老齢幼虫(体長20mm) 幼虫による被害果 雄成虫(前翅長18mm) 雌成虫(前翅長20mm) 幼虫による被害葉
適用薬剤 フェニックス顆粒水和剤 など

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには置かないでください。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9～12時、13～17時、土日祝日を除く)



HPIはこちらから