

2025年4月9日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2025年4月9日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

### 「日曹ファンタジスタ顆粒水和剤」

(農林水産省登録 第23103号)

#### 【 変更内容の概要 】

1. 作物名「ピーマン」に適用病害名「黒枯病」を追加。
2. 以下の作物名の使用方法に「無人航空機による散布」を追加。  
「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)」、  
「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)」、  
「あずき」、「いんげんまめ」、「えんどうまめ」、「そらまめ」、「だいず」、「さやいんげん」、  
「さやえんどう」、「未成熟そらまめ」及び「えだまめ」。
3. 使用上の注意事項に以下のとおり追加。  
(4) さやえんどうに使用する場合、高温や多湿条件下では、葉や莢に薬害を生じるおそれがあるので  
さけること。  
(8) 無人航空機で散布する場合は次の注意を守ること。
  - ① 散布は散布機種種の散布基準に従って実施すること。
  - ② 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
  - ③ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
  - ④ 散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意すること。
  - ⑤ 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。

一次ページへ続くー

## 【適用病害名・使用方法】

( 二重線太字 が変更部分 )

| 作物名                                                        | 適用病害名                        | 希釈倍数<br>(倍)     | 使用液量<br>(L/10a) | 使用時期        | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法                   | ピリベンカルブ<br>を含む農薬の<br>総使用回数 |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 豆類(種実、ただし、だいず、<br>あずき、いんげんまめ、<br>えんどうまめ、らっかせい、<br>そらまめを除く) | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2,000           | 100～300         | 収穫7日前<br>まで | 3回以内        | 散布                     | 3回以内                       |            |
|                                                            |                              | <u>32～64</u>    | <u>3.2</u>      |             |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |            |
|                                                            |                              | <u>64～128</u>   | <u>6.4</u>      |             |             |                        |                            |            |
| あずき                                                        | 菌核病<br>さび病<br>炭疽病<br>灰色かび病   | 2,000           | 100～300         |             |             | 散布                     |                            |            |
|                                                            |                              | <u>32～64</u>    | <u>3.2</u>      |             |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |            |
|                                                            | 菌核病<br>灰色かび病                 | <u>64～128</u>   | <u>6.4</u>      |             |             |                        |                            |            |
|                                                            |                              |                 |                 |             |             |                        |                            |            |
| いんげんまめ                                                     | 菌核病<br>炭疽病<br>灰色かび病          | 2,000           | 100～300         |             |             | 散布                     |                            |            |
|                                                            |                              | <u>32～64</u>    | <u>3.2</u>      |             |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |            |
|                                                            | 菌核病<br>灰色かび病                 | <u>64～128</u>   | <u>6.4</u>      |             |             |                        |                            |            |
|                                                            |                              |                 |                 |             |             |                        |                            |            |
| えんどうまめ                                                     | 菌核病<br>さび病<br>灰色かび病          | 2,000           | 100～300         |             |             | 散布                     |                            |            |
|                                                            |                              | <u>32～64</u>    | <u>3.2</u>      |             |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |            |
|                                                            | 菌核病<br>灰色かび病                 | <u>64～128</u>   | <u>6.4</u>      |             |             |                        |                            |            |
|                                                            |                              |                 |                 |             |             |                        |                            |            |
| そらまめ                                                       | 菌核病<br>さび病<br>赤色斑点病<br>灰色かび病 | 2,000           | 100～300         |             |             | 散布                     |                            |            |
|                                                            |                              | <u>32～64</u>    | <u>3.2</u>      |             |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |            |
|                                                            | 菌核病<br>灰色かび病                 | <u>64～128</u>   | <u>6.4</u>      |             |             |                        |                            |            |
|                                                            |                              |                 |                 |             |             |                        |                            |            |
| だいず                                                        | 紫斑病                          | 2,000～<br>4,000 | 100～300         |             |             | 散布                     |                            |            |
|                                                            | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2,000           |                 |             |             |                        |                            |            |
|                                                            |                              | <u>32～64</u>    |                 |             |             |                        |                            | <u>3.2</u> |
|                                                            |                              | <u>64～128</u>   | <u>6.4</u>      |             |             |                        |                            |            |

－ 次ページへ続く －

| 作物名                                                   | 適用病害名                        | 希釈倍数<br>(倍)    | 使用液量<br>(L/10a) | 使用時期                   | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法                   | ピリベンカルブ<br>を含む農薬の<br>総使用回数 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| 豆類(未成熟、ただし、<br>えだまめ、さやいんげん、<br>さやえんどう、<br>未成熟そらまめを除く) | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2,000          | 100～300         | 収穫前日<br>まで             | 3回以内        | 散布                     | 3回以内                       |
|                                                       |                              | <u>32～64</u>   | <u>3.2</u>      |                        |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |
|                                                       |                              | <u>64～128</u>  | <u>6.4</u>      |                        |             |                        |                            |
| さやいんげん                                                | 菌核病<br>炭疽病<br>灰色かび病          | 2,000          | 100～300         |                        |             | 散布                     |                            |
|                                                       |                              |                |                 |                        |             |                        |                            |
|                                                       | 菌核病<br>灰色かび病                 | <u>32～64</u>   | <u>3.2</u>      |                        |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |
|                                                       |                              | <u>64～128</u>  | <u>6.4</u>      |                        |             |                        |                            |
| さやえんどう                                                | 菌核病<br>さび病<br>灰色かび病          | 2,000          | 100～300         |                        |             | 散布                     |                            |
|                                                       |                              | <u>32～64</u>   | <u>3.2</u>      |                        |             | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |                            |
|                                                       |                              | <u>64～128</u>  | <u>6.4</u>      |                        |             |                        |                            |
| 未成熟そらまめ                                               | 菌核病<br>さび病<br>赤色斑点病<br>灰色かび病 | 2,000          | 100～300         | 散布                     |             |                        |                            |
|                                                       |                              |                |                 |                        |             |                        |                            |
|                                                       | 菌核病<br>灰色かび病                 | <u>32～64</u>   | <u>3.2</u>      | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |             |                        |                            |
|                                                       |                              | <u>64～128</u>  | <u>6.4</u>      |                        |             |                        |                            |
| えだまめ                                                  | 紫斑病                          | 2000～<br>4,000 | 100～300         | 散布                     |             |                        |                            |
|                                                       |                              |                |                 |                        |             |                        |                            |
|                                                       | 菌核病<br>灰色かび病                 | 2,000          |                 | <u>無人航空機<br/>による散布</u> |             |                        |                            |
|                                                       |                              | <u>32～64</u>   | <u>3.2</u>      |                        |             |                        |                            |
|                                                       |                              | <u>64～128</u>  | <u>6.4</u>      |                        |             |                        |                            |
|                                                       | 斑点病<br><u>黒枯病</u>            | 4,000          | 100～300         | 散布                     |             |                        |                            |

以上

札幌営業所（北海道） TEL:011-241-5581  
 仙台営業所（東北） TEL:022-227-1741  
 関東営業所（関東、甲信越、富山、石川） TEL:048-677-6010  
 大阪営業所（東海、近畿、中国、四国、福井） TEL:06-6229-7343  
 福岡営業所（九州、沖縄） TEL:092-771-1336