

殺菌剤

登録番号 第 24936 号

性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体

有効期限 5 年

毒 性 普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

包 装 500ml× 20 本

フセキワイド
フロアブル

殺菌剤分類 M7,53

日曹の農薬

有効成分 イミノクタジナルベシル酸塩 10.0%、ピリダクロメチル 11.7%

種 類 名 イミノクタジナルベシル酸塩・ピリダクロメチル水和剤

- 特 長
- うどんこ病に優れた効果を示します。
 - 既存薬剤の耐性菌*にも有効な新規作用機作のピリダクロメチルと、耐性菌リスクが低いイミノクタジナルベシル酸塩との混合剤です。（* Qoi剤、DMI剤、SDHI剤などで確認。）
 - トマトの葉かび病やすすかび病、なすのすすかび病などにも優れた効果を示します。
 - 天敵・有用昆虫に対して影響が少ない薬剤です。



製品ページはこちら

■適用病害名及び使用方法 (2025 年 5 月 20 日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	ピリダクロメチルを含む 農薬の総使用回数	使用方法
きゅうり	うどんこ病	1,000	100～300	収穫前日まで	4回以内	7回以内	4回以内	散布
	つる枯病							
すいか	うどんこ病					4回以内		
	つる枯病							
メロン	うどんこ病				3回以内	5回以内		
	つる枯病							
トマト	うどんこ病				2回以内	3回以内		
	すすかび病							
	葉かび病							
ミニトマト	うどんこ病				3回以内	2回以内		
	すすかび病							
	葉かび病							
なす	うどんこ病				4回以内	3回以内		
	すすかび病							
いちご	うどんこ病				10回以内 (育苗期は5回以内、 本圃では5回以内)			
	炭疽病							

- ⚠ 効果・薬害などの注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
 - 使用前によく振ってから使用してください。
 - 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ薬液を調製し、使いきってください。
 - 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
 - 本剤は、イミノクタジンを含む農薬のため、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲で使用してください。
 - 幼果期のメロンに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
 - 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

8. 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

9. 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリーム使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
10. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
11. かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
12. 夏期高温時の使用をさけてください。

● 水産動植物への影響

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 保管上の注意

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。

●小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
