

有効成分 セトキシジム 20.0%

種 類 名 セトキシジム乳剤

除草剤分類 1

危険物 第四類第2石油類 危険等級Ⅲ ポリアルキルベンゼン 火気厳禁

- 特 長
1. イネ科植物に優れた殺草作用を発揮します。

2. 登録作物にかかっても影響がなく、ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。

3. 浸透移行性に優れ、根まで枯殺します。

4. 散布液が乾けば降雨の影響はほとんどありません。

5. 土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。



製品ページはこちら

■適用作物・雑草名及び使用方法

(2025 年6月 25 日現在)

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数	使用方法	
			薬量 (mL)	希釈水量 (L)			
かんしょ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	100～150	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布	
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200	100			
		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	0.8～1.6		無人航空機 による散布	
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200				
こんにゃく		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～200	100～150	2回以内	雑草茎葉散布 又は 全面散布	
さといも		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで					
ばれいしょ		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫前日まで					200
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫前日まで					
やまのいも		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～200	100～150	1回		
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫60日前まで	200				
かぶ		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	150～200				
ごぼう		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで					
	イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200	100				
しょうが	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	150	100～150				

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数	使用方法
			薬量 (mL)	希釈水量 (L)		
だいこん	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	150～200	100～150	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200	100		
チコリ(根株)		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	100～150	2回以内	
てんさい		育苗期のイネ科雑草 1～3葉期 但し 収穫30日前まで	150～300 (0.3～0.6mL /ハ°-ハ°-ホ°ット6冊)	150(300mL /ハ°-ハ°-ホ°ット6冊)		
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200	100		
			150～200	通常散布 50～150 少量散布 25～50		
		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	300～400			
	レッドトップ					
シバムギ						
にんじん	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	150～200	100～150	1回	
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200			
もりあざみ		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	150～200		2回以内	
たまねぎ		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで				
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200			
食用ゆり		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200		1回	
にんにく		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで				
にら		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫前日まで				
ねぎ		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	100	2回以内	
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200			
あずき		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	150～200	100～150		
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200			
いんげんまめ		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	150～200			
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200			

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数	使用方法
			薬量 (mL)	希釈水量 (L)		
えんどうまめ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	100～150	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布
だいず				通常散布 50～150 少量散布 25～50		
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200	通常散布 50～100 少量散布 25～50		
		イネ科雑草9～10葉期 但し収穫30日前まで	250～300	100～150		
べにばないんげん		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～200			
らっかせい		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫90日前まで				
豆類(未成熟)		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで				
かぼちゃ						
すいか						
トマト						
カリフラワー		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	200	100		
ブロッコリー		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫7日前まで				
非結球あぶらな科 葉菜類		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	150～200	100～150		
		キャベツ				
イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで			200	100		
はくさい		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	150～200	100～150		
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200	100		
せり		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～200	100～150	2回以内	雑草茎葉散布
セルリー		イネ科雑草3～6葉期 但し収穫28日前まで			1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布
レタス		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで				
はっか		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで		100		
ほうれんそう		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで		100～150		

作物名 適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数	使用方法		
			薬量 (mL)	希釈水量 (L)				
アスパラガス	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫前日まで	150～200	100～150	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布		
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫前日まで	200	100				
いちご		イネ科雑草3～5葉期 ※但し収穫開始 14日前まで	150～200	100～150	2回以内			
ぎぼうし		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫75日前まで						
チコリ		根株養成期のイネ科雑 草3～5葉期 但し根株 掘上30日前まで			1回			
やまのいも(むかご)		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで			2回以内			
キノア		イネ科雑草3～6葉期 但し収穫14日前まで		100				
そば		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで		200	通常散布 50～150 少量散布 25～50	1回		無人航空機 による散布
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで						
		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	0.8～1.6				
		イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200					
なたね		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～200	100～150	2回以内	雑草茎葉散布 又は 全面散布		
おうぎ		イネ科雑草3～6葉期		100				
おけら		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで			2回以内			
しゃくやく(薬用)		イネ科雑草3～6葉期 但し収穫60日前まで			10回以内 (1年間に2回以内)			
せんきゅう				100～150	2回以内			
とうき		イネ科雑草3～6葉期 但し収穫14日前まで						
とりかぶと(薬用)		イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで						
みしまさいこ		イネ科雑草3～6葉期 但し収穫30日前まで						4回以内 (1年間に2回以内)
きく		イネ科雑草3～5葉期						3回以内
りんどう	イネ科雑草3～6葉期	100		1回				
わた	イネ科雑草3～5葉期			3回以内				
樹木類								

※いちごの使用時期は収穫開始 14 日前まで（収穫開始後は使用しない）。

作物名 適用場所		適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	10アール当たり 使用量		本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数	使用方法
				薬量 (mL)	希釈水量 (L)		
樹木等	公園、庭園 堤とう 駐車場 道路、運動場 宅地等	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期	150～400	100～200	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に雑草茎葉散布
			(草丈30cm)	200～400			
		ススキ チガヤ	(草丈40cm)	500～1,000	150～200		植栽地を除く 樹木等の周辺地 に局所散布
すぎ(床替床)		一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草3～5葉期	150～200	100～150	3回以内	雑草茎葉散布 又は 全面散布
ひのき(床替床)							
いぐさ							
たばこ			但し植付10日前まで、 または植付後10日 から大土寄期まで			1回	雑草茎葉畦面 散布
桑			草丈20～30cm	200～250	150～200	3回以内	雑草茎葉散布



効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布してください。
3. 広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占ほ場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
4. 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに 7 ～ 10 日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
5. 周辺のイネ科作物にかかるおそれがあるので、注意して散布してください。
6. そば、だいず及びてんさいについて、10 アール当りの使用液量を 25 ～ 50 L で散布する場合、少水量散布に適したノズルを使用してください。
7. 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - (1) 散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - (2) 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - (3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - (4) 散布終了後は機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また、使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
 - (5) そばに対して使用する場合には、葉に薬斑が生じるため高温時の散布をさけてください。
 - (6) 散布予定のほ場周辺にイネ科作物が栽培されている場合は、薬害を生じるおそれがあるので、無人航空機による本剤の散布は行わないでください。
8. 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
9. 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
 - (1) 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
 - (2) 散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって、有用植物に薬害が生じることを十分注意して散布してください。
 - (3) 水源池、養魚池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
10. 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
11. 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

12. 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲などのないように注意してください。
13. 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。
また散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
14. 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
15. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
16. 公園、提とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
17. 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

● 水産動植物への影響

水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用はさけてください。

● 保管上の注意

密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、保管してください。

○空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用してください。

● ナブ乳剤の上手な使い方

- ① 冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合には、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
-

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。

●小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。