

2025年6月25日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2025年6月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ナブ乳剤」

(農林水産省登録 第15992号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「そば」及び「かんしょ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加。
2. 作物名「樹木等」に使用時期「雑草生育期(草丈 30cm)」を追加。
3. 「使用上の注意事項」に以下のとおり追加。
 - (5) 周辺のイネ科作物にかかるると薬害を生じるおそれがあるので、注意して散布すること。
 - (7) 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ること。
 - ① 散布は散布機種種の散布基準に従って実施すること。
 - ② 散布に当たっては散布機種種に適合した散布装置を使用すること。
 - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ④ 散布終了後は機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。また、使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
 - ⑤ そばに対して使用する場合には、葉に薬斑が生じるため高温時の散布をさけること。
 - ⑥ 散布予定のほ場周辺にイネ科作物が栽培されている場合は、薬害を生じるおそれがあるので、無人航空機による本剤の散布は行わないこと。
4. 「安全使用上の注意事項」を以下のとおり変更。
 - (2) 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。また散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
 - (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
 - (4) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをすること。

—次ページへ続く—

【適用作物・雑草名及び使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	使用量		使用方法	本剤及び セトキシジム を含む農薬の 総使用回数
				薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)		
かんしょ	-		イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	150~ 200	100~ 150	雑草茎葉 散布又は 全面散布	
			イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで	200	100		
そば	-	一年生 イネ科雑草 (ス`メノカサ`ラを除く)	<u>イネ科雑草3~5葉期</u> <u>但し収穫30日前まで</u>	<u>150~</u> <u>200</u>	<u>0.8~</u> <u>1.6</u>	<u>無人航空機</u> <u>による散布</u>	1回
			<u>イネ科雑草6~8葉期</u> <u>但し収穫30日前まで</u>	<u>200</u>			
			<u>イネ科雑草3~5葉期</u> <u>但し収穫30日前まで</u>	<u>150~</u> <u>200</u>			
			<u>イネ科雑草6~8葉期</u> <u>但し収穫30日前まで</u>	<u>200</u>			
			イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	150~ 200			
イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで	200	少量散布 25~50					
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、運動場、 宅地等		イネ科雑草3~5葉期	150~ 400	100~ 200	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に雑草茎葉 散布	3回以内
			<u>(草丈30cm)</u>	<u>200~</u> <u>400</u>			
		ススキ チガヤ	(草丈40cm)	500~ 1,000	150~ 200	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に局所散布	

以上

札幌営業所 (北海道)	TEL:011-241-5581
仙台営業所 (東北)	TEL:022-227-1741
関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)	TEL:048-677-6010
大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井)	TEL:06-6229-7343
福岡営業所 (九州、沖縄)	TEL:092-771-1336