

殺菌剤

ミギワ[®]10

フロアブル

キノプロール

KINOPROL[®]

ACTIVE INGREDIENT

登録番号

第 24409 号

性 状

類白色水和性粘稠懸濁液体

有効期限

4 年

毒 性

普通物（毒劇物に該当しないものをさしている通称）

包 装

500ml ×20 本

殺菌剤分類

52

有効成分

イプフルフェノキン（通称キノプロール[®]） 10.0%

種 類 名

イプフルフェノキン水和剤

日曹の農薬

■特 長

1. 新規作用機構（DHODH 阻害）で既存剤の耐性菌にも有効です。

2. 灰色かび病、菌核病、炭疽病、つる枯病などを対象とした広い殺菌スペクトラムを有します。

3. 予防効果主体の殺菌剤です。浸透移行性も示します。

■適用病害名及び使用方法

(2025 年 8 月 27 日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	イプフルフェノキン を含む農薬の 総使用回数	使用方法
あずき	灰色かび病	1,000	100～300	収穫7日前 まで	3回以内	3回以内	散布
	菌核病						
	炭疽病						
いんげんまめ	灰色かび病						
	菌核病						
きゅうり	灰色かび病						
	菌核病						
	炭疽病						
	つる枯病						
トマト、 ミニトマト	灰色かび病						
	菌核病						
なす	灰色かび病						
	菌核病						
	うどんこ病						
	褐紋病						
ピーマン	うどんこ病						
	灰色かび病						
	炭疽病						
花き類・観葉植物 (ばら、きくを除く)	灰色かび病			発病前～ 発病初期			

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 使用前によく振ってから使用してください。

2. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。

3. 散布量は、対象作物の生育段階及び栽培形態に合わせて調整してください。

4. 過度の連用をさけ、なるべく作用機構の異なる薬剤との輪番で使用してください。

5. いちごの展開途上葉に薬液がかかると薬害を生じるおそれがあるので、周辺で栽培されている場合には注意して散布してください。

6. ばらの展開途上葉に薬液がかかると薬害を生じるおそれがあるので、周辺で栽培されている場合には注意して散布してください。

7. カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。

8. 蚕に対して影響を及ぼすので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。

1

ミギワ 10 フロアブル

9. 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
10. 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

● 保管上の注意

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

-
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。
 - 小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。
-