

有効成分 クレソキシムメチル 50.0%

種類名 クレソキシムメチル水和剤 殺菌剤分類 11

## ■特長

1. 有効成分クレソキシムメチルを含有し、従来の殺菌剤とは異なる作用機作を備えています。
2. りんご・なし等の黒星病菌に優れた効果を示し、かんきつ・ぶどうなど他の作物の重要な病害にも幅広い活性が認められています。
3. 予防効果が特に優れていますが、孢子形成阻害効果も示し二次感染を防ぎます。
4. ベーパーアクションの作用により、植物体に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することができます。



製品ページはこちら

## ■適用病害名及び使用方法

(2025年8月1日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤及びクレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法
かんきつ	そうか病	2,000～ 3,000	200～ 700	収穫14日前 まで	3回以内	散布
	黒点病					
	灰色かび病					
	そばかす病					
	褐色腐敗病					
黄斑病	2,000					
なし	輪紋病	2,000～ 3,000				
	黒斑病					
	うどんこ病					
	黒星病	3,000				
	炭疽病	2,000				
りんご	黒点病	3,000	収穫前日 まで			
	黒星病					
	うどんこ病					
	モニリア病					
	斑点落葉病	1,500～ 3,000				
	赤星病					
	炭疽病	2,000～ 3,000				
	輪紋病					
	すす点病					
	すす斑病					
褐斑病						
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	環紋葉枯病	2,000	収穫7日前 まで			
もも ネクタリン	黒星病		収穫前日 まで			
	うどんこ病					
	灰星病					
	縮葉病(休眠期)					
	黒斑病					

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤及びクレソキシムメチルを含む 農薬の総使用回数	使用方法		
うめ	黒星病	2,000～ 3,000	200～ 700	収穫7日前 まで	3回以内	散布		
	すす斑病							
	うどんこ病	2,000						
	灰色かび病							
	環紋葉枯病							
炭疽病	すもも							
環紋葉枯病								
ぶどう	黒とう病	2,000～ 3,000		200～ 700			収穫14日前 まで	2回以内
	べと病							
	枝膨病							
	晩腐病							
	灰色かび病	3,000			3回以内			
	褐斑病							
	うどんこ病							
	さび病							
ブルーベリー	斑点病	3,000	200～ 700	収穫7日前 まで	3回以内			
	灰色かび病							
あけび(果実)	うどんこ病	2,000～ 3,000	200～ 700	収穫14日前 まで	2回以内			
かき	落葉病							
	炭疽病							
キウイフルーツ	灰色かび病	2,000	200～ 700	収穫前日 まで	3回以内			
	貯蔵病害 (灰色かび病)							
	すす斑病							
さんしょう(果実)	さび病	3,000	200～ 700	収穫14日前 まで	2回以内			
バナナ	黒星病							
マンゴー	炭疽病	3,000	200～ 700	収穫21日前 まで	3回以内			
かき(葉)	うどんこ病			3,000		200～ 700	収穫前日 まで	
	落葉病						収穫14日前 まで	
	炭疽病							
	灰色かび病							
じんちょうげ	黒点病	3,000	200～ 700	発病初期	3回以内			
せいようきんしばい	さび病							
ぼけ	赤星病							
	褐斑病							
ポプラ	マルゾニナ落葉病	3,000	200～ 700	発病初期	3回以内			
やなぎ	葉さび病							

## 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
3. ボルドー液との混用はさけてください。
4. なしに使用する場合は、開花始めから落花 30 日頃までの散布においては、葉に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
5. 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
6. 開花期以降のおうとうには、薬害が生じるおそれがあるので、周辺にある場合にはかからないように注意してください。
7. ぶどうに使用する場合は次の事項に注意してください。
  - (1) ロザリオビアンコには葉に薬害を生じるので散布をさけてください。
  - (2) 巨峰及びデラウェアを除く品種には、新梢伸長期から開花直前までの散布は葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
  - (3) 落花 20 日以降袋かけ前までの散布は果粉溶脱や汚れを生じる場合があるので注意してください。
8. かきに使用する場合、西条の新梢伸長期の散布では、葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
9. 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
10. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

## 安全使用上の注意

11. 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
12. 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

### ● 水産動植物への影響

水産動植物（藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

### ● 保管上の注意

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

- 
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。
  - 小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。
-