

殺菌剤

登録番号

第 21117 号

性 状

淡褐色水和性細粒

有効期限

3 年

毒 性

普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

包 装

（100g×25 袋）×2箱

殺菌剤

日曹の農薬

パンチョ®TF

顆粒水和剤

有効成分

シフルフェナミド 3.4%、トリフルミゾール 15.0%

種 類 名

シフルフェナミド・トリフルミゾール水和剤

殺菌剤分類

U6,3

- 特 長
1. 各種作物のうどんこ病に優れた効果を示すシフルフェナミドと殺菌スペクトラムの広いトリフルミゾールとの混合剤です。

2. 優れた予防効果に加え、治療効果も有します。

3. 植物体に速やかに移行するので、繁茂した葉でも病原菌の侵入を防ぎます。

4. 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
- 
- 製品ページはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2025 年 9 月17 日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	シフルフェナミド を含む農薬の 総使用回数	トリフルミゾール を含む農薬の 総使用回数	使用方法
りんご	うどんこ病	2,000	200～ 700	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	3回以内	散布
おうとう	灰星病			収穫14日 前まで			2回以内	
さやえんどう	うどんこ病		100～ 300	収穫前日 まで			5回以内	
きゅうり		4回以内						
ズッキーニ		3回以内						
にがうり		5回以内 (種子粉衣は 1回以内)						
かぼちゃ		5回以内						
すいか								
うり類(漬物用)								
メロン								
トマト								
ミニトマト								
なす								
ピーマン								
いちご								
麦類		60～ 150	収穫14日 前まで	3回以内 (種子粉衣は 1回以内)				
花き類・観葉植物		100～ 300	－	5回以内			5回以内	
さるすべり				2回以内			2回以内	
まさき								

効果・薬害などの注意

1. 本剤は顆粒がかたまりになって溶けにくくなる場合がありますので、薬液調製の際はよく攪拌してください。なお、かたまった本剤を希釈して使用しても品質及び効果に問題はありません。
2. うり類の幼苗期には、濃緑化症状及び生育抑制が生じることがあるので、使用しないでください。
3. カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後 14 日間は入水しないでください。
4. 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
5. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
6. 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
7. 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

8. 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
9. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
10. 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は洗眼してください。

● 保管上の注意

密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した所に保管してください。

● パンチョTF顆粒水和剤の上手な使い方

- ①一般にハウスなどの施設栽培メロンに使用する場合は、特にネット系メロンでは、交配 2 ～ 3 日前から交配 20 日後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の使用はさけてください。
また散布後高温が予想される場合は、使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。

●小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。
