

2025年11月26日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2025年11月26日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベルクートフロアブル」

(農林水産省登録 第19884号)

【変更内容の概要】

- 作物名「りんどう」を追加。
- 作物名「りんご」の適用病害名「黒点病」の希釈倍数「1,000倍」を「1,000~1,500倍」に変更。
- 作物名「りんご」に適用病害名「うどんこ病」、「黄腐病」及び「モニリア病」を追加。
- 作物名「みかん」及び「かんきつ(みかんを除く)」に適用病害名「貯蔵病害(白かび病)」を追加。
- 作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加。

【適用病害名・使用方法】

(二重線太字が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イミノクタジン を含む農薬の 総使用回数
りんどう	<u>葉枯病</u> <u>花腐菌核病</u>		<u>300</u>	<u>発病前～ 発病初期</u>	<u>8回以内</u>		<u>8回以内</u>
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病 <u>うどんこ病</u>	<u>1,000～ 1,500</u>	200～700	収穫前日 まで	6回以内 (但し、 開花期以降 散布は 3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び 水和剤は 合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は 2回以内)
	<u>黄腐病</u> <u>モニリア病</u>						

-次ページへ続く-

日曹農薬登録速報 251126-2 ベルクートフロアブル

作物名	適用病害名	希釀倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イミノクタジン を含む農薬の 総使用回数
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1,000	200~700	3回以内	散布	3回以内	
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) <u>貯蔵病害(白かび病)</u>	1,000~ 2,000					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 20	4~5 8~10				
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) <u>貯蔵病害(白かび病)</u>	1,000	200~700	収穫前日 まで	無人航空機 による散布	2回以内	
	幹腐病						
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) <u>貯蔵病害(白かび病)</u>	1,000~ 2,000					
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) <u>貯蔵病害(白かび病)</u>	10 20	4~5 8~10	2回以内	散布	2回以内	
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	1,000					
	幹腐病						
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) <u>貯蔵病害(白かび病)</u>	1,000~ 2,000	200~700	収穫前日 まで	無人航空機 による散布	2回以内	
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 20	4~5 8~10				
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) <u>貯蔵病害(白かび病)</u>	1,000					
たまねぎ	灰色かび病	1,000	100~300	5回以内	散布 <u>無人航空機 による散布</u>	5回以内	
	灰色腐敗病						
	小菌核病	8	<u>1.6~3.2</u>				

以上

札幌営業所 (北海道)

TEL:011-241-5581

仙台営業所 (東北)

TEL:022-227-1741

関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)

TEL:048-677-6010


大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井)

TEL:06-6229-7343

福岡営業所 (九州、沖縄)

TEL:092-771-1336

登録速報が
LINEで届く！



日本曹達農業化学品
LINE 公式アカウント
はじめました！