



無人航空機登録農薬一覧 (抜粋)



日本曹達
農業化学品ホームページ

殺菌剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法		
トップジンMゾル 殺菌剤分類 1	稻	いもち病 変色米(エピコッカム菌)	4~8	0.8	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
		墨黒穗病 紋枯病	8	0.8					
	小麦	雪腐大粒菌核病	10	0.8	根雪前	3回以内 (出穂期以降は2回以内)			
		赤かび病	8	0.8	収穫14日前まで				
	麦類(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	10	0.8	根雪前	3回以内 (出穂期以降は1回以内)			
		赤かび病	8	0.8	収穫21日前まで				
	だいす	紫斑病	5~8	0.8~1.6	収穫14日前まで	4回以内			
	たまねぎ	灰色腐敗病	5	0.8	収穫前日まで	3回以内			
			16	2.4					
	ブロッコリー	菌核病	8	0.8~1.6	収穫14日前まで	2回以内			
	やまのいも	葉渋病 炭疽病	5	3	収穫7日前まで	5回以内			
	みかん	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	10~15	5	収穫前日まで	5回以内			
			20~30	10					
	かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	15	5	収穫前日まで	5回以内			
			30	10					
トリフミン水和剤 殺菌剤分類 3	かんしょ	基腐病	16	0.8~1.6	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布		
	しきみ	うどんこ病	60	10~30	発病初期	5回以内			
ファンタジスタ顆粒水和剤 殺菌剤分類 11	豆類(種実、ただし、だいす、あづき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
			64~128	6.4					
	あづき	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	いんげんまめ	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	えんどうまめ	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	そらまめ	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2	収穫前日まで				
			64~128	6.4					
	だいす	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	さやいんげん	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	さやえんどう	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	未成熟そらまめ	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
	えだまめ	菌核病 灰色かび病	32~64	3.2					
			64~128	6.4					
ファンタジスタフロアブル 殺菌剤分類 11	だいす	紫斑病、菌核病 褐色輪紋病	16	0.8	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
	小麦	赤かび病	16	0.8	収穫14日前まで	3回以内			
	かんきつ	灰色かび病	16	4~10	収穫14日前まで	3回以内			
ストロビーフロアブル 殺菌剤分類 11	やまのいも やまのいも(むかご)	葉渋病	24	3	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
			10	0.8	収穫14日前まで	3回以内			
	たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	20	1.6					
			40	3.2					
	にんにく	さび病	8	0.8	収穫7日前まで	3回以内			
			16	1.6					
			32	3.2					
	にんじん	黒葉枯病 斑点病	16	1.6	収穫7日前まで	3回以内			

殺菌剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
ピシリックフロアブル 殺菌剤分類 U17	だいこん	白さび病、ツッカ症	8	1.6	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	
	はなやさい類	べと病	8	1.6	収穫前日まで	2回以内		
ベルクートフロアブル 殺菌剤分類 M7	にんじん	斑点病	8	2	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	
	やまのいも	葉渋病	12	3	収穫7日前まで	3回以内		
	アスパラガス	斑点病	8	1.6	※収穫開始7日前まで	5回以内		
	みかん	灰色かび病	10	4~5	収穫前日まで	3回以内		
		貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	20	8~10				
	かんきつ(みかんを除く)	灰色かび病	10	4~5	収穫前日まで	2回以内		
		貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	20	8~10				
ベルクート水和剤 殺菌剤分類 M7	びわ	灰斑病 灰色かび病	10	4	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	
エキナイン顆粒水和剤 殺菌剤分類 27、40	ばれいしょ	疫病	40	1.6	収穫7日前まで	4回以内	無人航空機による散布	

※アスパラガスの使用時期は収穫開始7日前まで(収穫開始後は使用しない)。

殺虫剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
モスピランSL液剤 殺虫剤分類 4A	ばれいしょ	アブラムシ類	64	3.2	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	
	未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	3.2	収穫14日前まで	3回以内		
コテツフロアブル 殺虫剤分類 13	しょうが	ハスモンヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	
	かんしょ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	16	1.6	収穫前日まで	2回以内		
	しきみ	クスアナアキゾウムシ	60	6~21	発生初期	2回以内		
口ムダンフロアブル 殺虫剤分類 18	かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	8	0.8	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	
フェニックス顆粒水和剤 殺虫剤分類 28	キャベツ	ヨトウムシ オオタバコガ アオムシ、コナガ ハスモンヨトウ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	
			20	2				
			32	3.2				
	はくさい	オオタバコガ アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	16	1.6	収穫前日まで	3回以内		
			20	2				
			32	3.2				
	プロッコリー	ヨトウムシ コナガ ハスモンヨトウ	16	1.6	収穫前日まで	2回以内		
			20	2				
			32	3.2				
	レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	2回以内		
			20	2				
			32	3.2				
	非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	2回以内		
			20	2				
			32	3.2				
	ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ	16	1.6	収穫7日前まで	3回以内		
			20	2				
			32	3.2				
	かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	16~32	0.8~1.6	収穫前日まで	2回以内		
	しょうが	アワノメイガ ハスモンヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内		
	やまのいも	ナガイモコガ ハスモンヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内		
	とうもろこし ヤングコーン	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内		
	飼料用とうもろこし (子実)	アワノメイガ オオタバコガ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内		
	てんさい	シロオビノメイガ ヨトウムシ	40	1.6	収穫前日まで	2回以内		
			50	2				
			80	3.2				

殺虫剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
フェニックスフロアブル 殺虫剤分類 28	くり	モモノゴマダラノメイガ クスサン	40	2~4	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	
	だいす	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	16~32	0.8	収穫7日前まで	3回以内		
			20~40	1				
			32~64	1.6				
	えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	16~32	0.8	収穫前日まで	3回以内		
			20~40	1				
			32~64	1.6				
	てんさい	ヨトウムシ	32	1.6	収穫前日まで	2回以内		
			40	2				
			64	3.2				
	キャベツ はくさい	アオムシ	16	0.8~1.6	収穫前日まで	3回以内		
			20	1~2				
			32	1.6~3.2				
			50	4~5				
	レタス	オオタバコガ	16	0.8~1.6	収穫前日まで	2回以内		
			20	1~2				
			32	1.6~3.2				
			50	4~5				
	非結球レタス	オオタバコガ	16	0.8~1.6	収穫前日まで	2回以内		
			20	1~2				
			32	1.6~3.2				
			50	4~5				
	かんしょ	ハスモンヨトウ	16~32	0.8~1.6	収穫前日まで	2回以内		

除草剤 薬剤名	作物名	適用雑草名	使用時期(雑草生育期)	薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)	本剤の使用回数	使用方法	
ナブ乳剤 除草剤分類 1	かんしょ	一年生イネ科雑草(ズメカ タラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	150~200	0.8~1.6	1回	無人航空機 による散布	
			イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで	200	0.8~1.6			
	そば	一年生イネ科雑草(ズメカ タラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	150~200	0.8~1.6	1回		
			イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで	200	0.8~1.6			

※2026年1月21日現在の登録内容に基づいて作成しています。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。



日本曹達株式会社