

ベトファイター®

顆粒水和剤

有効成分 シモキサニル 24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0%

種類名 シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤

殺菌剤分類 27,40

■特長

- それぞれの有効成分が治療効果を有する混合剤です。
- 高い予防性と持続性で疫病、べと病の発病を抑えます。
- 高い感染抑制効果により、初期に植物体内に侵入した病原菌についても効果を発揮します。
- 浸達性・浸透移行性に優れるため、散布ムラを生じても安定した防除効果が期待できます。



製品ページはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2025年11月21日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	シモキサニルを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	使用方法		
ぶどう	べと病	2,000~3,000	200~700	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	散布		
ばれいしょ	疫病	1,500~2,000	100~300	収穫7日前まで	4回以内	4回以内	5回以内			
たまねぎ	べと病	2,000			3回以内	3回以内	3回以内			
	白色疫病									
らっきょう	べと病			収穫14日前まで	4回以内					
ねぎ	べと病									
だいず	茎疫病	2,000~3,000		2回以内	収穫7日前まで	2回以内				
	べと病									
きゅうり	べと病	2,000		3回以内	収穫前日まで	3回以内	3回以内			
かぼちゃ	疫病									
すいか	褐色腐敗病	2,000		3回以内	収穫3日前まで	3回以内	5回以内			
メロン	べと病									
トマト	疫病								収穫前日まで	3回以内
ミニトマト										
なす	褐色腐敗病	2,000~3,000		4回以内						
たばこ	疫病				100~180	収穫10日前まで	2回以内		2回以内	2回以内

効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
2. ボルドー液等のアルカリ性農薬との混用はさけてください。
3. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調整してください。
4. 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
5. 薬液や薬液タンクの洗浄廃液は放置せず、速やかに安全な場所に処理してください。
6. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

7. 誤飲・誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
8. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
9. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
10. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

● 保管上の注意

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

-
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。
 - 小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。
-