

# 殺菌剤

農林水産省登録  
第21117号

# パンチョTF<sup>®</sup> 顆粒水和剤




**大切な作物をうどんこ病から守る！  
予防と治療の殺菌剤！！**



## パンチョTFの効果

### メロン/うどんこ病に対する効果

(社)日本植物防疫協会研究所 高知試験場(2003年)




品 種：アールスメイト夏系2号  
 試験場所：場内ビニルハウス  
 散布日：5/6、5/13  
 調査日：5/20、5/27  
 発生：小発生条件から散布開始。その後急激に進展し、最終調査時には甚発生。  
 調査：各区全株を対象として、本葉8葉目から上に10葉の発病を程度別に調査。

### きゅうり/うどんこ病に対する効果

日本曹達株式会社 小田原研究所(2003年)

#### 散布14日後の効果



※発病後に散布した場合、病斑が葉上に残る場合がありますが、病害の進展はありません。



殺菌剤

# パンチョTF 顆粒水和剤

■有効成分／シルフエナミド……………3.4%  
トリフルミゾール……………15.0%

殺菌剤分類 U6,3

■人畜毒性／普通物  
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

- ① 各種作物のうどんこ病に優れた効果を示すシルフエナミドと殺菌スペクトラムの広いトリフルミゾールとの混合剤です。
- ② 優れた予防効果に加え、治療効果も有します。
- ③ 植物体に速やかに移行するので、繁茂した葉でも病原菌の侵入を防ぎます。
- ④ 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

## 効果的な使用方法

- ① 発病初期に予防的な散布
- ② 作用性の異なる薬剤とのローテーション散布

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	シルフエナミドを含む農薬の総使用回数	トリフルミゾールを含む農薬の総使用回数	使用方法	
麦類	うどんこ病	2,000	60~150	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	3回以内 (種子粉衣は1回以内)	散布	
いちご、きゅうり、すいか、メロン、なす、ピーマン、トマト、ミニトマト、うり類(漬物用)、さやえんどう、実えんどう			100~300	収穫前日まで			5回以内		
かぼちゃ			4,000	200~700			収穫7日前まで		5回以内 (種子粉衣は1回以内)
にがうり									3回以内
ズッキーニ									4回以内
りんご	うどんこ病	2,000	200~700	収穫14日前まで	2回以内	3回以内			
おうとう			100~300	-		2回以内			
まさき、さるすべり、花き類・観葉植物	うどんこ病	-	100~300	-	-	5回以内	5回以内	-	

## ●上手な使い方

一般にハウスなどの施設栽培メロンに使用する場合、特にネット系メロンでは、交配2~3日前から交配20日後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の使用はさけてください。また、散布後高温が予想される場合は、使用しないでください。

## ⚠️ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
- 顆粒がかたまりになって溶けにくくなる場合があるので、薬液調製の際はよく攪拌してください。なお、かたまつた本剤を希釈して使用しても品質及び効果に問題はありません。
- うり類の幼苗期には、濃緑化症状及び生育抑制が生じることがあるので、使用しないでください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさげ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

## ⚠️ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
  - かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
  - 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は洗顔してください。
  - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 保管：密封し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥し所に保管してください。

包装：(100g×25袋)×2箱

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は、2026年6月現在の登録内容に基づいています。



## 日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号  
お問合せ (03)4212-9655  
(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容、SDSはこちら



LINE 公式アカウント