



殺菌剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
トップジンMゾル 殺菌剤分類 1	稲	いもち病 変色米(ヒレコカム菌)	4～8	0.8	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機 による散布
		墨黒穂病 紋枯病	8	0.8			
	小麦	雪腐大粒菌核病	10	0.8	根雪前	3回以内 (出穂期以降は2回以内)	
		赤かび病	8	0.8	収穫14日前まで		
	麦類(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	10	0.8	根雪前	3回以内 (出穂期以降は1回以内)	
		赤かび病	8	0.8	収穫21日前まで		
	だいず	紫斑病	5～8	0.8～1.6	収穫14日前まで	4回以内	
	たまねぎ	灰色腐敗病	5	0.8	収穫前日まで	3回以内	
			16	2.4			
	ブロッコリー	菌核病	8	0.8～1.6	収穫14日前まで	2回以内	
	やまのいも	葉渋病 炭疽病	5	3	収穫7日前まで	5回以内	
	みかん	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	10～15	5	収穫前日まで	5回以内	
			20～30	10			
	かんきつ(みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	15	5	収穫前日まで	5回以内	
			30	10			
ファンタジスタ顆粒水和剤 殺菌剤分類 11	豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布
			64～128	6.4			
	あずき	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	いんげんまめ	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	えんどうまめ	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	そらまめ	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	だいず	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2	収穫前日まで		
			64～128	6.4			
	さやいんげん	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	さやえんどう	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
	未成熟そらまめ	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2			
			64～128	6.4			
えだまめ	菌核病 灰色かび病	32～64	3.2				
		64～128	6.4				
ファンタジスタフロアブル 殺菌剤分類 11	だいず	紫斑病、菌核病 褐色輪紋病	16	0.8	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布
	小麦	赤かび病	16	0.8	収穫14日前まで	3回以内	
	かんきつ	灰色かび病	16	4～10	収穫14日前まで	3回以内	
ストロビーフロアブル 殺菌剤分類 11	やまのいも やまのいも(むかご)	葉渋病	24	3	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布
	たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	10	0.8	収穫14日前まで	3回以内	
			20	1.6			
			40	3.2			
	にんにく	さび病	8	0.8	収穫7日前まで	3回以内	
			16	1.6			
			32	3.2			
	にんじん	黒葉枯病 斑点病	16	1.6	収穫7日前まで	3回以内	

殺菌剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法		
トリフミン水和剤 殺菌剤分類 3	かんしょ	基腐病	16	0.8～1.6	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布		
	しきみ	うどんこ病	60	10～30	発病初期	5回以内			
ピシロックフロアブル 殺菌剤分類 U17	だいこん	白さび病、ワッカ症	8	1.6	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布		
	はなやさい類	べと病	8	1.6	収穫前日まで	2回以内			
	キャベツ	べと病	8	1.6	収穫前日まで	3回以内			
			16	3.2					
	鱗茎類(根物)※	べと病	8	1.6	収穫前日まで	3回以内			
			16	3.2					
	鱗茎類(葉物)※	べと病	8	1.6	収穫前日まで	3回以内			
			16	3.2					
	さといも	疫病	8	1.6	収穫前日まで	3回以内			
			16	3.2					
ムッシュボルドーDF 殺菌剤分類 M1	かんきつ	かいよう病 そうか病	8	8～10	発病前～発病初期	—	無人航空機 による散布		
			16	16～20					
			32	30～40					
バルクートフロアブル 殺菌剤分類 M7	にんじん	斑点病	8	2	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機 による散布		
	やまのいも	葉渋病	12	3	収穫7日前まで	3回以内			
	アスパラガス	斑点病	8	1.6	※収穫開始 7日前まで	5回以内			
	みかん	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 20	4～5 8～10	収穫前日まで	3回以内			
		かんきつ(みかんを 除く)	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 20				4～5 8～10	収穫前日まで
	バルクート水和剤 殺菌剤分類 M7		びわ	灰斑病 灰色かび病	10	4		収穫7日前まで	
	エキナイン顆粒水和剤 殺菌剤分類 27、40	ばれいしょ	疫病	40	1.6	収穫7日前まで		4回以内	無人航空機 による散布

※アスパラガスの使用時期は収穫開始7日前まで(収穫開始後は使用しない)。

殺虫剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
モスピランSL液剤 殺虫剤分類 4A	ばれいしょ	アブラムシ類	64	3.2	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布
	未成熟とうもろこし	アブラムシ類	64	3.2	収穫14日前まで	3回以内	
ロムダンフロアブル 殺虫剤分類 18	かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	8	0.8	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布
フェニックス顆粒水和剤 殺虫剤分類 28	キャベツ	ヨトウムシ オオタバコガ アオムシ、コナガ ハスモンヨトウ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	3回以内	無人航空機 による散布
			20	2			
			32	3.2			
	はくさい	オオタバコガ アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	16	1.6	収穫前日まで	3回以内	
			20	2			
			32	3.2			
	ブロッコリー	ヨトウムシ コナガ ハスモンヨトウ	16	1.6	収穫前日まで	2回以内	
			20	2			
			32	3.2			
	レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	2回以内	
			20	2			
			32	3.2			
	非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	2回以内	
			20	2			
			32	3.2			
	ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ	16	1.6	収穫7日前まで	3回以内	
			20	2			
			32	3.2			
	かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	16～32	0.8～1.6	収穫前日まで	2回以内	
	しょうが	アワノメイガ ハスモンヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内	
	やまのいも	ナガイモコガ ハスモンヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内	
	とうもろこし ヤングコーン	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内	
	飼料用とうもろこし (子実)	アワノメイガ オオタバコガ	32	3.2	収穫前日まで	2回以内	
	てんさい	シロオビノメイガ ヨトウムシ	40	1.6	収穫前日まで	2回以内	
			50	2			
			80	3.2			

※鱗茎類(根物)には、たまねぎ、葉たまねぎ、にんにく、葉にんにく、らっきょうなど、鱗茎類(葉物)には、あさつき、にら、ねぎ、わけぎなどが含まれます。

殺虫剤 薬剤名	作物名	病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
フェニックスフロアブル 殺虫剤分類 28	くり	モモノゴマダラノメイガ クスサン	40	2～4	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布
	だいず	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	16～32	0.8	収穫7日前まで	3回以内	
			20～40	1			
			32～64	1.6			
	えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	16～32	0.8	収穫前日まで	3回以内	
			20～40	1			
			32～64	1.6			
	てんさい	ヨトウムシ	32	1.6	収穫前日まで	2回以内	
			40	2			
			64	3.2			
	キャベツ	アオムシ	16	0.8～1.6	収穫前日まで	3回以内	
			20	1～2			
			32	1.6～3.2			
			50	4～5			
	はくさい	アオムシ	16	0.8～1.6	収穫前日まで	3回以内	
			20	1～2			
			32	1.6～3.2			
			50	4～5			
	レタス	オオタバコガ	16	0.8～1.6	収穫前日まで	2回以内	
			20	1～2			
			32	1.6～3.2			
			50	4～5			
	非結球レタス	オオタバコガ	16	0.8～1.6	収穫前日まで	2回以内	
			20	1～2			
			32	1.6～3.2			
			50	4～5			
	かんしょ	ハスモンヨトウ	16～32	0.8～1.6	収穫前日まで	2回以内	

除草剤 薬剤名	作物名	適用雑草名	使用時期(雑草生育期)	薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)	本剤の使用回数	使用方法
ナブ乳剤 除草剤分類 1	かんしょ	一年生イネ科雑草(スズメカ 死ぐを除外)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	0.8～1.6	1回	無人航空機 による散布
			イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200	0.8～1.6		
	そば	一年生イネ科雑草(スズメカ 死ぐを除外)	イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～200	0.8～1.6	1回	無人航空機 による散布
			イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200	0.8～1.6		

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
●記載以外には使用しないでください。
●小児の手の届く所には置かないでください。



日本曹達株式会社

※2026年9月11日現在の登録内容に基づいて作成しています。
※日曹コテツフロアブルは、弊社からの販売は終了いたしました。